

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/03/1574
Aurizon ausu pilieni, suspensija suņiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
B.P. 189
70204 Lure Cedex
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
F - 70200 Lure
Francija

un

Vetoquinol Biowet Sp z o.o.
13-14 Kosynierow Gdynskich st.
66-400 Gorzów Wlkp.
Polija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Aurizon ausu pilieni, suspensija lietošanai suņiem

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Marboflokscācīns | 3,0 mg |
| Klotrimazols | 10,0 mg |
| Deksametazona acetāts | 1,0 mg (atbilst 0,9 mg deksametazona) |

Papildvielas:

Propilgallāts (E310)
Sorbitāna oleāts
Bezūdens koloidāls silīcija oksīds
Vidējās ķēdes triglicerīdi

4. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem bakteriālas un sēnīšu izcelsmes *Otitis externa* ārstēšanai, attiecīgi, ko izraisa pret marboflokscācīnu jutīgas baktērijas un pret klotrimazolu jutīgas sēnītes, īpaši *Malassezia pachydermatis*.

Veterinārās zāles lietot pamatojoties uz jutīguma pārbaudes rezultātiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot suņiem ar perforētu bungādiņu.

Nelietot, ja zināma pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citām azola pretsēnīšu zālēm vai citiem fluorhinoloniem, vai kādu no palīgvielām.

Nelietot grūsnām vai laktējošām kucēm.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var novērot ar kortikosteroīdu lietošanu saistītas blakusiedarbības (bioķīmisko un hematoloģisko rādītāju izmaiņas, piemēram, sārmainās fosfatāzes un aminotransferāzes līmeņa palielināšanās, neliela neitrofilija).

Ilgstoša un intensīva lokālo kortikosteroīdu lietošana var izraisīt gan lokālas, gan sistēmiskas reakcijas, tādas kā virsniņu darbības nomākumu, plāna epiderma un kavēta brūču dzīšana.

Retos gadījumos veterināro zāļu lietošana var būt saistīta ar pārejošu kurlumu, galvenokārt novērojams vecākiem suņiem.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai ausīs.

Pirms lietošanas labi saskalināt.

Ārējās auss kanālā aplicē 10 pilienus katru dienu 7-14 dienas pēc kārtas.

Pēc 7 dienu lietošanas veterinārārstam ir jānovērtē nepieciešamība turpināt ārstēšanu vēl vienu nedēļu.

Viens pilienis suspensijas satur 71 µg marbokloksacīna, 237 µg klotrimazola, 23,7 µg deksametazona acetāta.

Pēc aplikācijas var nedaudz maigi pamasēt auss pamatni, lai veterinārās zāles iekļūtu dziļāk auss kanālā.

Ja vienu flakonu lieto vairākiem suņiem, tad katram sunim lieto citu kanulu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Paļaušanās uz vienas grupas antibiotikām var novest pie baktēriju rezistences izveidošanās baktēriju populācijā. Fluorohinoloni jālieto tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji pakļaujas vai sagaidāms, ka tie vāji pakļausies ārstēšanai ar citas grupas antibiotikām.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāpārbauda bungādiņas veselums.

Pirms ārstēšanas ārējais auss kanāls rūpīgi jāiztīra un jānosusina.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Pirms ārstēšanas ārējais auss kanāls rūpīgi jāiztīra un jānosusina. Baktēriju un sēnīšu izraisīts auss iekaisums bieži ir tikai citas slimības sekas. Jānosaka slimības cēlonis un jāārstē.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Paļaušanās uz vienas grupas antibiotikām var novest pie baktēriju rezistences izveidošanās baktēriju populācijā.

Fluorhinoloni jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kas vāji vai iespējami vāji atbild uz ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobajiem līdzekļiem.

Pirms ārstēšanas uzsākšanas ir jāpārbauda bungādiņas veselums.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc zāļu lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas.

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm. Ja zāles iekļuvušas acīs, nekavējoties skalot acis ar lielu ūdens daudzumu.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību (alerģiju) pret (fluor)hinoloniem, (kortiko)steroīdiem vai pretsēnīšu līdzekļiem un šo veterināro zāļu palīgvielām, vajadzētu izvairīties no kontakta ar šīm veterinārajām zālēm.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības vai laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Izmaiņas hematoloģiskajos un bioķīmiskajos rādītājos (palielināts sārmainā fosfatāzes un aminotransferāzes līmenis, neliela neitrofīlija, eozinopēnija, limfopēnija) novēro, lietojot 3 reizes lielākās devās kā norādīts. Šie simptomi nav nopietni un rādītāji atgriezīsies normas robežās, pārtraucot zāļu lietošanu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.