

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/94/0280

**Be-Complex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem,  
kaķiem, ūdelēm un lapsām**

### 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

bela-pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Vācija

### 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Be-Comlex šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem, ūdelēm un lapsām**

### 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Iml satur:

#### **Aktīvās vielas:**

Tiamīna hlorīda hidrohlorīds (B1 vitamīns)	10, 00 mg
Riboflavīna nātrija fosfāts (B2 vitamīns)	5, 47 mg
Piridoksīna hidrohlorīds (B6 vitamīns)	4, 00 mg
Nikotīnamīds	50, 00 mg
D-kalcija pantotenāts	5, 00 mg

#### **Palīgviela:**

Benzilsprits	15, 0 mg
--------------	----------

### 4. INDIKĀCIJA(-S)

Komplekso B vitamīnu (B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, nikotīnamīds, pantotēnskābe) deficīta ārstēšanai un pastiprinātas vitamīnu nepieciešamības gadījumā zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem, ūdelēm un lapsām.

### 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

### 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc atkārtotas B1 vitamīna lietošanas atsevišķos gadījumos var novērot pastiprinātas jutības reakcijas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));  
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);  
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);  
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);  
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Zirgi, liellopi, cūkas, suņi, kaķi, ūdeles un lapsas.

## **8. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai:

Zirgiem un liellopiem:	30 ml/dzīvniekam;
Kumeļiem, teļiem, cūkām:	20 ml/dzīvniekam;
Sivēniem, zīdējsivēniem:	2 ml/dzīvniekam;
Suņiem:	3 ml/dzīvniekam;
Kaķiem, ūdelēm, lapsām:	1 ml/dzīvniekam.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Lietot vienreizējas injekcijas veidā.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt ledusskapī (2 -8 °C). Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

### Grūsnība un laktācija:

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Lai izvairītos no nevēlamas zāļu mijiedarbības, nelietot kopā ar citām zālēm.

### Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

01/2018

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.