

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/03/1552
Biocan R suspensija injekcijām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bioveta, a. s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Biocan R suspensija injekcijām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela: *Inaktivēts trakumsērgas vīruss*, celms SAD Vnukovo-32 min. 2 IU

Palīgvielas: MEM barotne, alumīnija hidroksīda suspensija, tiomersāls

4. INDIKĀCIJA(-S)

Mērķa sugu dzīvnieku aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Drudzis. Nevakcinēt dzīvniekus, kuri bijuši saskarē vai kurus ievainojuši ar trakumsērgu slimi dzīvnieki. Līdz novērošanas perioda beigām nevakcinēt dzīvniekus, kuri sakoduši cilvēkus.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lokāla audu reakcija injekcijas vietā, parasti zirņa lielumā, kura izzūd 3 nedēļu laikā. Ļoti reti novērojamas hipersensitivitātes reakcijas. Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, kažokzvēri, liellopi, zirgi, aitas, kazas, cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Deva vienam dzīvniekam ir 1 ml neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, svara un sugas. Dzīvniekus vakcinē sākot no 12 nedēļu vecuma.

Ievadīšanas veids:

- subkutāni, ieteicams pleca apvidū zem lāpstiņas;
- intramuskulāri, ieteicams iegurņa apvidus muskulī.

Dzīvnieki tiek vakcinēti no 3 mēnešu vecuma. Imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc imunizācijas. Dzīvnieki, kas tiek vakcinēti, pirms tie sasniedz 3 mēnešu vecumu, ir jāvakcinē atkārtoti pēc šī vecuma sasniegšanas (jāievēro minimālais intervāls -14 dienas starp divām vakcinācijām). Dzīvnieki, kas pirmo reizi vakcinēti vecumā no 3–12 mēnešiem, ir jārevakcinē 1 gadu pēc pirmās vakcinācijas veikšanas. Lai saglabātu imunitāti pēc pirmās revakcinācijas (1 gadu pēc sākotnējās vakcinācijas), atkārtota revakcinācija jāveic ik pēc 2 gadiem ievadot vienu vakcīnas devu.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vakcīnu *Biocan R* var lietot atsevišķi, vienlaicīgi vai kombinācijā ar citām *Biocan* vakcīnām:

A) vakcīnu *Biocan R* var lietot kā šķīdinātāju citām liofilizētām *Biocan* vakcīnām (piemēram, *DHPPi*, *DP*, *P*);

B) vakcīnu *Biocan R* var lietot vienlaicīgi ar šķīdrajām vakcīnām *Biocan C*, *Biocan B*, *Biocan M* un *Biocan L*.

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota kopā ar citām, izņemot iepriekš minētajām veterinārajām zālēm. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas jāpieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Ieteicamā *Biocan* vakcīnu lietošanas shēma

Kucēna vecums	Epizootiskā situācija		
	Labvēlīga	Nelabvēlīga — parvoviroze	Nelabvēlīga — suņu mēris
5–6 nedēļas		<i>Puppy (P) + C</i>	<i>Puppy (DP) + C</i>
7–8 nedēļas		<i>Puppy (P) + C</i>	<i>Puppy (DP) + C</i>
8-10 nedēļas	<i>DHPPi + L</i>	<i>DHPPi + L</i>	<i>DHPPi + L</i>
12-16 nedēļas	<i>DHPPi + LR</i>	<i>DHPPi + LR</i>	<i>DHPPi + LR</i>
Ikgadējā revakcinācija	<i>DHPPi + LR</i>	<i>DHPPi + LR</i>	<i>DHPPi + LR</i>

Piezīme.

Vakcīnas iekavās — *Biocan Puppy* vietā iespējams lietot alternatīvu vakcīnu.

Vakcīnas atzīmētas ar *+C*, *+L*, *+LR* — iespējams lietot vienlaicīgi vai kombinācijā ar citām *Biocan* vakcīnām (piemēram, *DHPPi*, *DHP*, *DP*, *DH*, *P*, *Puppy*).

Papildu iespējamās vakcīnas: *Biocan M* — vakcīna pret *Microsporum canis* suņiem un kaķiem no 12 nedēļu vecuma.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas flakona saturu saskalināt.

Vakcinēt drīkst tikai klīniski veselus dzīvniekus. Dzīvnieku dehelmentizācija ir jāveic vismaz 10 dienas pirms vakcinācijas. Vienu nedēļu pēc vakcinācijas dzīvniekus nepakļaut fiziskai slodzei vai jebkādiem citiem sasprindzinājumiem.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nav

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt sausā un tumšā vietā (2–8 °C). Nesasaldēt.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 8 stundas. Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Grūsnība: Pilnvērtīgas imunitātes iegūšanai nevakcinēt dzīvniekus divas nedēļas pirms dzemdībām (manipulācijas, nemiers, antivielu veidošanās u.c.).

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2014

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšana - tikai praktizējošiem veterinārārstiem.