

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/01/1332

Biocan DHPPI inj. sicc. ad us. vet. dzīva liofilizēta vakcīna suņiem

1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

Biovaeta, a.s., Ivanovice na Hane, Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Biocan DHPPI inj. sicc. ad us. vet. dzīva liofilizēta vakcīna suņiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Liofilizēta vakcīna satur -

Aktīvās vielas:

suņu mēra vīruss	ne mazāk kā $10^{3,0}$ TCID ₅₀
suņu kontagiozā laringotraheīta vīrussu	ne mazāk kā $4 \times 10^{3,0}$ TCID ₅₀
suņu parvovīruss	ne mazāk kā $10^{4,5}$ TCID ₅₀
suņu parainfluenes vīruss	ne mazāk kā $10^{3,0}$
lizējošā vide līdz 1ml	

Komplektā:

Šķīdinātājs (ūdens injekcijām) 1 ml

4. INDIKĀCIJA(-AS)

Suņu aktīvai imunizācijai pret mēri, infekciozo hepatītu, infekciozo laringotraheītu, parvovīrusa infekciju un parainfluenci.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Drudzis

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Deva: 1ml subkutāni, neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, ķermeņa svara vai šķirnes, sākot no 6 nedēļu vecuma. Ievadīšanas veids – subkutāni, ieteicams pleca apvidū zem lāpstiņas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vakcīnu Biocan DHPPi var lietot atsevišķi vai vienlaicīgi ar citām Biocan vakcīnām, saskaņā ar vakcīnu lietošanas shēmu, vai lietot kombinācijā ar šķidrajām vakcīnām Biocan (LR, L, C, R).

Ieteicamā Biocan vakcīnu lietošanas shēma:

Vakcinācijas režīmu nosaka veterinārārsts, atkarībā no epizootiskās situācijas un kolostrālo antivielu radītās pasīvās imunitātes vakcinējamiem dzīvniekiem. Lai uzturētu ilgstošu imunitāti, jāveic ikgadēja revakcinācija.

Kucēna vecums	Epizootiskā situācija		
	Labvēlīga	Nelabvēlīga – parvoviroze	Nelabvēlīga – suņu mēris
5-6 nedēļas		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7-8 nedēļas		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8-10 nedēļas	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12-16 nedēļas	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Ikgadēja revakcinācija	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Piezīme:

Vakcīnas iekavās (P, R, DP, DHPPi) – vietā iespējams lietot alternatīvu Biocan vakcīnu.
+C, +L, +LR – iespējams lietot vienlaicīgi vai kombinācijā ar citām vakcīnām.

Turpmākā iespējamā vakcinācija ar:

Biocan M plus – vakcīna pret *Microsporum canis* suņiem, sākot no 8 nedēļu vecuma,

Biocan B – vakcīna pret Laima slimību suņiem, sākot no 12 nedēļu vecuma,

Biocan T – vakcīna pret stingumkrampjiem suņiem, sākot no 12 nedēļu vecuma.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt sausā, tumšā vietā temperatūrā +2°C-+8°C.

Vakcīna jāizlieto nekavējoties pēc atšķaidīšanas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcinēt drīkst tikai klīniski veselus dzīvniekus. Dzīvnieku dehelmintizācija ir jāveic vismaz 10 dienas pirms vakcinācijas. Vienu nedēļu pēc vakcinācijas dzīvniekus nepakļaut fiziskai slodzei.

Vakcīna jāizlieto nekavējoties pēc atšķaidīšanas.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2011

15. CITA INFORMĀCIJA

Tikai praktizējošam veterinārārstam