

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/01/1333
Biocan LR inj. ad us. vet. suspensija injekcijai suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

Biovaeta, a.s., Ivanovice na Hane, Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Čehijas Republika.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Biocan LR inj. ad us. vet. suspensija injekcijai suņiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:

Inaktivēts trakumsērgas vīruss	min 1 SV
Inaktivēts <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i>	min 4 x 10 ^{7,0}
Inaktivēts <i>Leptospira canicola</i>	min 4 x 10 ^{7,0}
Alumīnija hidroksīda suspensija	
Barotne	

4. INDIKĀCIJA(-AS)

Suņu aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu un leptospirozi, kuru ierosina vakcīnā iekļautie seroloģiskie varianti.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Drudzis. Nevakcinēt dzīvniekus, kuri bijuši saskarsmē vai kurus ievainojuši ar trakumsērgu slimi dzīvnieki. Līdz novērošanas perioda beigām nevakcinēt dzīvniekus, kuri sakoduši cilvēkus.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējama lokāla audu reakcija injekcijas vietā (ne vairāk kā 5mm diametrā), kura izzūd 3 nedēļu laikā. Iespējamās hipersensivitātes reakcijas.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Deva: 1ml subkutāni, neatkarīgi no dzīvnieka vecuma, ķermeņa svara vai šķirnes.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vakcīnu Biocan LR var lietot atsevišķi vai vienlaicīgi ar citām Biocan vakcīnām.

- A) vakcīnu Biocan LR inj. ad us. vet. var lietot kā šķīdinātāju citām liofilizētām Biocan vakcīnām (piemēram, Biocan DHPPi, DHP, DP, P).
- B) Vakcīnu Biocan LR inj. ad us. vet. var lietot kombinācijā arī ar šķīdrajām vakcīnām Biocan C, Biocan B vai Biocan M .

Ieteicamā Biocan vakcīnu lietošanas shēma:

Kucēna vecums	Epizootiskā situācija		
	Labvēlīga	Nelabvēlīga – parvoviroze	Nelabvēlīga – suņu mēris
5-6 nedēļas		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7-8 nedēļas		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8-10 nedēļas	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12-16 nedēļas	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Ikgadēja revakcinācija	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Piezīme:

Vakcīnas iekavās – Biocan Puppy vietā iespējams lietot alternatīvu vakcīnu.

+C, +L, +LR – iespējams lietot vienlaicīgi vai kombinācijā ar citām Biocan vakcīnām (P, DP, DHP, DHPPi, Puppy).

Biocan vakcīnas ļauj veikt vakcināciju pret tādām nopietnām slimībām kā: Laima slimība (Biocan B) sākot no 12 nedēļu vecuma; *Microsporum canis* ierosinātas ādas slimības (Biocan M plus) sākot no 8 nedēļu vecuma; stingumkrampji (Biocan T) suņiem, sākot no 12 nedēļu vecuma.

Vakcinācijas shēma:

Primārā vakcinācija, sākot no 8 nedēļu vecuma. Ja nepieciešamas, kucēnus no 8 nedēļu vecuma var vakcinēt ar vakcīnu Biocan L vai Biocan LR inj. ad us. vet. (ja apkārtņē ir trakumsērga). Tad 12 nedēļu vecumā veic revakcināciju ar vakcīnu Biocan LR inj. ad us. vet.un, lai uzturētu ilgstošu imunitāti, jāveic ikgadēja revakcinācija.

Primārā vakcinācija, sākot no 12 nedēļu vecuma. Kucēni jāvakcinē ar vakcīnu Biocan LR inj. ad us. vet. un jārevakcinē ar vakcīnu Biocan L ievērojot intervālu 14-28 dienas. Lai uzturētu ilgstošu imunitāti pret leptospirozi un trakumsērgu, jāveic ikgadēja revakcinācija ar vakcīnu Biocan LR inj. ad us. vet..

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (+2⁰C - +8⁰C).

Nesasadēt.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus. Dzīvnieku dehelmentizācija ir jāveic vismaz 10 dienas pirms vakcinācijas. Vienu nedēļu pēc vakcinācijas dzīvniekus nepakļaut fiziskai slodzei. Lai nesatrauktu dzīvnieku, neiesaka veikt vakcināciju divas nedēļas pirms dzemdībām (darbošanās ar grūsnu dzīvnieku u.c.). Vakcīna jāizlieto uzreiz pēc flakona atvēršanas.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2011

15. CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:

10 x 1ml

20 x 1 ml

50 x 1 ml

100 x 1 ml