

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/02/1496

**Biocatalin** šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem un trušiem

### 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A.  
Via Emilia, 285  
Ozzano Emilia (BO)  
Itālija

### 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Biocatalin** šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem un trušiem

### 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

#### **Aktīvās vielas:**

Aknu un rauga sēnīšu hidrolizāts kā aminoskābju avots*	350 mg
B 12 vitamīns (ciānkobalamīns)	10 µg
B 1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds)	0,5 mg
B 2 vitamīns (riboflavīna nātrija fosfāts)	1,0 mg
B 6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds)	0,5 mg
PP vitamīns (nikotīnamīds)	20 mg
Pantotēnskābe	2,50 mg

**Palīgvielas:** līdz 1 ml

\*arginīns, leicīns, metionīns, valīns, histidīns, lizīns, treonīns, izoleicīns, fenilalanīns, triptofāns, tirozīns, cisteīns, serīns, glutamīnskābe, asparagīnskābe, glicīns, alanīns, prolīns.

### 4. INDIKĀCIJA(-S)

Slimības, kuras izraisa vai saistītas ar olbaltumvielu un B grupas vitamīnu trūkumu:

- stresa situācijas (antibiotiku, ķīmijterapeitisko līdzekļu lietošana, vakcinācija u.c.);
- vispārējs vārgums (anēmijas, diareja, vemšana, toksikozes, gremošanas un elpošanas orgānu slimības, ķirurģiskas manipulācijas u.c.);
- pastiprināts olbaltumvielu patēriņš (grūsnība, zīdīšanas periods, pārpūle);
- augšanas un attīstības traucējumi, atveseļošanās pēc pārslimotām slimībām, ēstgribas trūkums.

### 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

## 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, kumelji, liellopi, teļi, aitas, cūkas, sivēni, suņi, kaķi, truši.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai sekojošās devās:

Zirgiem, liellopiem	10- 20 ml
Kumeljiem, teļiem, aitām, cūkām	5 - 10 ml
Suņiem, kaķiem, trušiem	2 - 5 ml
Sivēniem	1 - 2 ml

Zāles lietot zemākajā noteiktajā devā 3-5 dienas ilgi, maksimāli līdz pat 15 dienām smagākos nepietiekamības gadījumos; augstākās devās lietot 2-3 reizes nedēļā 2-3 nedēļas ilgi vieglas līdz vidējas nepietiekamības gadījumos.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt vēsā, tumšā vietā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

08/2017

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 100 ml.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"  
Mētru iela 6,  
Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430  
Latvija