

Carbotox

Lietošanai dzīvniekiem!

Diētiska papildbarība cūkām. Sastāvs: kokogle 20% (7.13.1.); kalcija karbonāts 0,5 % (11.1.1.). Tehnoloģiskas piedevas 1kg: barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošās vielas 1m - bentonīts (1m558i) 630 g. Uzturfizioloģiskas piedevas 1kg: mikroelementi 3b - cinks (cinka oksīds, 3b603) 119 g. Analītiskie komponenti: lizīns 0%, metionīns 0%, kalcijs 0,8%, nātrijs 0,9%, fosfors 0%.

Darbība. Carbotox satur vielas, kas ir ar savelkošām īpašībām, un kurām piemīt augstas absorbcijas spējas - saista zarnu gāzes, pūšanas fermentācijas produktus, kā arī baktēriju un pelējuma sēņu toksīnus. Saista arī amonjaku, uzlabojot turēšanas apstākļus novietnē. Preparāts stabilizē gremošanas procesus. Cinks aktivizē vielmaiņu, stimulē fermentu, hormonu, nukleīnskābju, fermentu sintēzi, aktivizē garšas un smaržas receptorus, līdz ar to palielinot barības izmantojamību.

Pielietošana. gremošanas traucējumu riska gadījumā, traucējumu laikā un pēc tiem, lai uzlabotu barības sagremojamību, regulētu gremošanas trakta peristaltiku caurejas gadījumā. Maisījums novērš barības salipšanu, tās pelēšanu un fermentāciju.

Devas un lietošana. 0.5-1 kg uz 1 t barības, kas atbilst 0,05 – 0.1% barības maisījumā. Gremošanas traucējumu un to riska gadījumā, lietot 2-4 nedēļas. Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Ir jāizvairās no vienlaicīgas produkta lietošanas ar perorāli lietojamām makrolīdu grupas antibiotikām. Iepakojums: Noslēgti plastmasas spaiņi, izmēru skat. uz iepakojuma. Uzglabāšana. Preparāts ir higroskopisks- glabāt sausā vietā temperatūrā līdz 25 C, aizvērtā oriģinālajā iepakojumā! Derīguma termiņš un ražošanas partijas numurs norādīts uz iepakojuma. Ražotājs: „ Biofaktor ” S.p.z.o.o., Polija, αPL0861004p. Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventpils iela 50; Rīga; tālr. 80000060, bar. izpl.. Nr. LV 019020.