

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/20/0024

Cloteid 4 suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a. s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Čehijas Republika

Tel. +420 517 318 500

fax +420 517 318 319

e-pasts: comm@bioveta.cz

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cloteid 4 suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, suņiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (1ml) satur:

Aktīvā viela:

Attīrīts tetanusa anatoksinš RP \geq 1 *

*RP = relatīvā potence (ELISA tests), salīdzinot antivielu līmeni jūrascūciņu asins serumā, ar antivielu līmeni references serumā, kas iegūts, vakcinējot jūrascūciņas un salīdzinot ar starptautisko standartu.

Adjuvants:

Algedrāts 0,1 ml

Palīgviela:

Tiomersāls 0,15 mg

Gaiši pelēka vai gaiši brūna suspensija.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Zirgu, liellopu, aitu, kazu un suņu aktīvai imūnizācijai pret stingumkrampjiem no 3 mēnešu vecuma.

Imunitātes iestāšanās: 14 - 21 dienas laikā pēc pamatvakcinācijas.

Imunitātes ilgums: vismaz 2 gadi, zirgiem – 4 gadi.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot slimiem, novājējušiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, pret adjuvantu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Vakcīnas ievadīšana atsevišķos gadījumos var izraisīt pastiprinātu jutību. Šādos gadījumos veikt simptomātisku ārstēšanu.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas, kazas un suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Pirms lietošanas saskalināt.

Deva – 1 ml, neatkarīgi no dzīvnieka sugas, vecuma, svara.

Ievadīšanas veids: intramuskulāra injekcija gūžas muskulatūrā.

Pamatvakcinācija: 2 devas ar 3 nedēļu intervālu, sākot no 3 mēnešu vecuma.

Revakcinācija: ir ieteicama ik pēc 2 gadiem, zirgiem ik pēc 4 gadiem. Atsevišķos riska gadījumos revakcināciju var veikt agrāk.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zirgiem vakcīnu ir ieteicams ievadīt gūžas muskulatūrā, lietojot sausās adatas metodi.

Ļoti nemierīgiem zirgiem vakcīnu var ievadīt kakla vai krūšu muskulatūrā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Zirgiem, liellopiem, aitām, kazām: nulle dienas.

Suņiem: nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Uzglabāt sausā vietā.

Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas (daudzdevu iepakojumiem).

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc “EXP”.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Jājamzirkus, sporta zirkus un darba zirkus ir ieteicams vakcinēt laikā, kad nav intensīva fiziska slodze.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Nav noteikti.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Divkārtas devas ievadīšanas gadījumā netika novērotas citas blakusparādības kā tikai tās, kas minētas punktā "Iespējamās blakusparādības".

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:

2 × 1 ml, 10 × 1 ml, 20 × 1 ml,

1 × 5 ml, 10 × 5 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.