

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/DCP/11/0002
Dehinel Plus Flavour tabletes suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovēnija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Horvātija
Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francija
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dehinel Plus Flavour tabletes suņiem

Praziquantel, pyrantel embonate, febantel

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur:

Prazikvantels	50 mg
Pirantela embonāts	144 mg
Febantels	150 mg

Dzeltenas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes ar redzamiem tumšākiem plankumiem, ar krustveida dalījuma līniju vienā pusē.

Tableti var sadalīt 2 vai 4 vienādās daļās.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem un kucēniem jauktu nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai, kuras ierosina sekojošas parazītu sugas:

Nematodes

Cērmes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (pieauguši parazīti un nenobriedušu kāpuru formas vēlīnā stadijā).

Āķtārpi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (pieauguši parazīti).

Cestodes

Lenteņi: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem.

Nepārsniegt noteiktās devas, lietojot grūsnām kucēm.

Nelietot dzīvniekiem, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot suņiem, kuri jaunāki par 2 nedēļām un/vai suņiem, kuru svars ir mazāks par 2 kg.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retos gadījumos kucēniem var novērot šķidrās fekālijas, diareju un/vai vemšanu. Pieaugušiem suņiem ļoti retos gadījumos var novērot vemšanu ar vai bez diarejas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā);
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus gadījumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi (maza un vidēja auguma).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Devas

Ieteicamā deva ir 15 mg/kg ķermeņa svara (ķ.sv.) febantela, 14,4 mg/kg ķ.sv. pirantela un 5 mg/kg ķ.sv. prazikvantela. Tas atbilst 1 tabletei uz 10 kg ķermeņa svara.

Lai piemērotu devu, tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās.

Tableti(-es) var dot tieši sunim mutē vai paslēptu(-as) barībā. Pirms vai pēc zāļu lietošanas pieeja barībai nav jāierobežo.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu pareizas devas lietošanu, pēc iespējas precīzi jānosaka ķermeņa svars.

Kucēnus var attārpot sākot no 2 nedēļu vecuma un tad ik pēc 2 nedēļām līdz 12 nedēļu vecumam. Pēc tam tie jāārstē ar trīs mēnešus ilgu starplaiku. Vienlaikus ar kucēniem ieteicams ārstēt arī kuci.

Toxocara kontrolei laktējošām kucēm vajadzētu dot 2 nedēļas pēc dzemdībām un ik pēc 2 nedēļām līdz zīdīšanas beigām.

Rutīnas veida kontrolei ieteicams lietot pa vienai devai ar trīs mēnešus ilgu starplaiku.

Smagas veltņtārpu invāzijas gadījumā pēc 14 dienām deva jāatkārto.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc "EXP".
Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Izplatīta lenteņa tipa - *Dipylidium caninum* - starpsaimnieki ir blusas. Lenteņu invāzija noteikti atkārtosies, ja vien netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu apkarošana.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Neizlietotās tablešu daļas ir jāiznīcina.

Nelietot suņiem, kuri jaunāki par 2 nedēļām un/vai suņiem, kuru svars ir mazāks par 2 kg.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personām, kuras dod tabletes tieši sunim mutē vai piemaisa suņa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Ja notikusi nejauša tablešu norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Pirms grūsnu dzīvnieku ārstēšanas pret veltņtārpiem, konsultēties ar veterinārārstu.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Nelietot kucēm grūsnības pirmo divu trimestru laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna (ir daudzu suņiem paredzētu prettārpu līdzekļu sastāvā) pretparazitārā iedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var radīt toksicitāti.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Benzimidazoliem ir augsts lietošanas drošuma līmenis. Pirantels netiek sistēmiski absorbēts nekādā daudzumā. Prazikvantelam arī ir augsts drošas lietošanas līmenis, kas līdz 5 reizēm var pārsniegt ieteicamo devu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:

Perforēts Al-Al blisteris: 2 tabletes (1 blisteris ar 2 tabletēm) kastītē.
Perforēts Al-Al blisteris: 4 tabletes (2 blisteri ar 2 tabletēm) kastītē.
Perforēts Al-Al blisteris: 10 tabletes (1 blisteris ar 10 tabletēm) kastītē.
Perforēts Al-Al blisteris: 30 tabletes (3 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.
Perforēts Al-Al blisteris: 50 tabletes (5 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.
Perforēts Al-Al blisteris: 100 tabletes (10 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.
Perforēts Al-Al blisteris: 300 tabletes (30 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA KRKA Latvija
Tel.: 67338610
Fakss: 67338151

Bezrecepšu veterinārās zāles.

*Tikai 100 tablešu iepakojumiem

1 uz 10 kg

Veterinārārsta zīmogs

Dzīvnieka īpašnieka vārds:
.....
Dzīvnieka vārds:
.....
Deva:.....
.....