

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### 1. Veterināro zāļu nosaukums

Dehinel 230 mg/20 mg apvalkotās tabletes kaķiem

### 2. Sastāvs

Katra apvalkotā tablete satur:

**Aktīvās vielas:**

Pirantela embonāts	230 mg (atbilst 80 mg pirantela)
Prazikvantels	20 mg

Balta līdz gandrīz balta, abpusēji izliekta, ovālas formas apvalkotā tablete, ar dalījuma līniju vienā pusē. Tableti var sadalīt uz pusēm.

### 3. Mērķsugas

Kaķi.

### 4. Lietošanas indikācijas

Jauktu invāziju ārstēšanai, ko kaķiem izraisījuši šādi veltnētārpi, āķtārpi un lenteņi:

- cērmes (veltnētārpi): *Toxocara cati* (pieauguši parazitīti);
- āķtārpi: *Ancylostoma tubaeforme* (pieauguši parazitīti), *Ancylostoma braziliense* (pieauguši parazitīti);
- lenteņi: *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera (Taenia) taeniaeformis*, *Mesocestoides* spp., *Joyeuxiella pasqualei*.

### 5. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret jebkuru no palīgvielām.

Lūdzu, skatīt 6. sadaļu.

### 6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši brīdinājumi:

Lenteņu invāzija kaķiem notiek ne ātrāk kā trešajā dzīves nedēļā.

Blusas ir starpsaimnieki vienai no visbiežāk sastopamākajām lenteņu sugām — *Dipylidium caninum*. Invadēšanās ar lenteņiem var atkārtoties, ja netiek iznīcināti to starpsaimnieki, piemēram, blusas, peles.

Jācenšas izvairīties no turpmāk minētajām darbībām, jo tās palielina rezistences veidošanās risku un var būt par iemeslu neefektīvai ārstēšanai:

- pārāk bieža un atkārtota vienas grupas antihelmintisko līdzekļu ilgstoša lietošana;
- pārāk mazas devas lietošana, kas iespējama nepietiekami noteikta ķermeņa svara vai veterināro zāļu nepareizas lietošanas dēļ.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Ja notikusi nejauša zāļu norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Personai, kura dod tabletes tieši kaķim vai pievieno tās kaķa barībai, pēc tam jānomazgā rokas, ievērojot higiēnas normas.  
Neizlietotās sadalītās tabletes daļas ievietot atpakaļ atvērtajā blistera nodalījumā un uzglabāt drošā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

#### Citi piesardzības pasākumi:

Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Tā kā ehinokokoze ir slimība, par kuru jāziņo Pasaules dzīvnieku veselības organizācijai (World Organisation for Animal Health (OIE)), no attiecīgās kompetentās iestādes jāsaņem īpaši norādījumi par ārstēšanu un uzraudzību, kā arī cilvēku veselības aizsardzību.

#### Grūsnība:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības laikā.  
Nelietot grūsnības laikā.

#### Laktācija:

Drīkst lietot laktācijas laikā.

#### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo piperazīna specifiskā iedarbība (parazītu neiromuskulārā paralīze) var inhibēt pirantela darbību (parazītu spastiskā paralīze).

#### Pārdozēšana:

Pārdozēšanas simptomi parādās, ja norādītā deva tiek piekārtīgi pārsniegta. Pirmā sagaidāmā intoksikācijas pazīme ir vemšana.

#### Būtiska nesaderība:

Nav piemērojama.

## **7. Blakusparādības**

Kaķi:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Gremošanas traucējumi (piemēram, hipersalivācija un/vai vemšana)* Neiroloģiski traucējumi (piemēram, ataksija)*
--	--

\* Viegli un īslaicīgi

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv)

## **8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode**

Iekšķīgai lietošanai. Vienreizēja deva.

*Deva:*

5 mg prazikvantela un 20 mg pirantela (57, 5 mg pirantela embonāta) uz kilogramu ķermeņa svara. Tas atbilst 1 tabletei uz 4 kg ķermeņa svara.

Ķermeņa svars	Tabletes
1,0 - 2,0 kg	½
2,1 - 4,0 kg	1
4,1 - 6,0 kg	1 ½
6,1 - 8,0 kg	2

Neārstēt ar šīm veterinārajām zālēm kaķēnus, kuri sver mazāk par 1 kg, jo šiem kaķiem nav iespējams piemērot atbilstošu devu.

*Lietošanas veids:*

Tableti jādod kaķim tieši mutē, bet, ja nepieciešams, to var piejaukt nelielam barības daudzumam.

## **9. Ieteikumi pareizai lietošanai**

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Cērmju invāzijas gadījumā, īpaši kaķēniem, iespējama nepilnīga parazitū iznīcināšana, tāpēc var saglabāties cilvēku invadēšanās risks. Tādēļ jāveic atkārtota ārstēšana ar 14 dienu starplaiku līdz 2 – 3 nedēļām pēc atšķiršanas no kaķenes, lietojot piemērotas veterinārās zāles pret velņtārpiem.

Ja slimības pazīmes saglabājas vai parādās atkārtoti, konsultēties ar veterinārārstu.

## **10. Ierobežojumu periods**

Nav piemērojams.

## **11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt neizmantotās sadalīto tablešu daļas temperatūrā līdz 25 °C. Katru reizi, kad neizmantotā sadalītā tabletes daļa tiek uzglabāta līdz nākamajai lietošanas reizei, tā jāievieto atvērtajā blistera nodalījumā un jāuzglabā drošā bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Dalītas tabletes derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: 1 mēnesis.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kastītes pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

## **12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai**

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

## **13. Veterināro zāļu klasifikācija**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

**14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi**

V/DCP/17/0010

2 x 1, 4 x 1, 10 x 1, 30 x 1, 50 x 1 vai 100 x 1 tablete perforētā dozējamo vienību blisterī, kastītē.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

**15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta**

07/2023

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

**16. Kontaktinformācija:**

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Horvātija

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

SIA KRKA Latvija

Tel.: +37125187879

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar tirdzniecības atļaujas turētāja vietējo pārstāvi.