

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/92/0216

Depedin suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Depedin suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem
Prednisolone acetate/Dexamethasone

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Prednizolona acetāts	7,50 mg
Deksametazons	2,50 mg

Palīgviela(-s):

Benzilspirts	10,0 mg
--------------	---------

4. INDIKĀCIJA(-S)

Zirgiem, liellopiem, teļiem, cūkām, sivēniem, suņiem un kaķiem:

- acetonēmija, pēcdzemdību parēze, tetānija, gremošanas traucējumi, stiegru, gļotsomiņu iekaisums, artrīts, mastīts, lumbago;
- anafilakse, nātrene, neparazitāras etioloģijas ekzēma, nieze, flegmona, reimatisms, apdegumi, stress.

Sivēnmātēm:

- agalaktija kā pēcdzemdību septicēmijas, toksēmijas, eklampsijas sekas.

Sivēni:

- sivēnu tūskas slimība.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot:

- grūsnēm dzīvniekiem grūsnības pēdējā trešdaļā, jo kortikosteorīdi var izraisīt abortu,
- osteoporozes gadījumā,
- *Diabetes mellitus* gadījumā,
- vīrusu infekciju gadījumā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Depedin kavē adrenokortikotropā hormona (AKTH) sintēzi, tāpēc ilgstoša zāļu lietošana izraisa virsnieru garozas funkcijas nomākumu. Pēc vienreizējas Depedin ievadīšanas šī blakusparādība izzūd 5 dienu laikā. Dzīvnieku nepieciešams novērot tikai tad, ja zāles lieto ilgstoši, veicot vairākkārtējas injekcijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, cūkas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai.

Zirgiem	10 ml.
Liellopiem	8 ml.
Teļiem	4 ml.
Cūkām	8 ml.
Sivēniem	2 ml.
Suņiem	0,5 ml.
Kaķiem	0,3 ml.

Pirms lietošanas flakonu saskalināt.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav piemērojami.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem:

Zirgi, liellopi: 8 dienas.

Cūkas: 6 dienas.

Pienam: liellopi: 24 stundas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Sargāt no gaismas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ar šīm veterinārām zālēm jāapietas uzmanīgi. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Kortikosteroīdu lietošana grūsnības pēdējā trešdaļā var izraisīt abortu. Lietot laktācijas laikā tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas, jo ārstēto dzīvnieku piens var aizkavēt jaundzimušo vai zīdāmo dzīvnieku augšanu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA PĀRSKATĪTA

04/2022

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: kastīte ar 1 x 50 ml, 12 x 50 ml flakoniem.