

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/MRP/08/1590**  
**Drontal Puppy 15/5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Vetoquinol S.A.  
Magny-Vernois  
70200 Lure  
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
24106 Kiel  
Vācija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Drontal Puppy 15/5 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem**  
Febantels 15 mg/ml / Pirantels 5 mg/ml

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1 ml satur:

**Aktīvās vielas:**

Febantels	15,00 mg
Pirantels	5,0 mg (kā pirantela embonātu 14,40 mg)

**Palīgvielas:**

Nātrija benzoāts (E211)	2,05 mg
Nātrija propionāts (E281)	2,05 mg
Ponceau 4R (E124)	0,25 mg

Gaiši sarkana suspensija.

**4. INDIKĀCIJAS**

Kucēniem un jauniem suņiem līdz viena gada vecumam apaļtārpu invāziju ārstēšanai, kuras izraisa:

Cērmes:	<i>Toxocara canis</i> <i>Toxascaris leonina</i>
Āķtārpi:	<i>Ancylostoma caninum</i> <i>Uncinaria stenocephala</i>
Matgalvji:	<i>Trichuris vulpis</i>

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot grūsnām un laktējošām kucēm.  
Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu saturošām veterinārajām zālēm.

## 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos var novērot vieglus, pārejošus gremošanas trakta darbības traucējumus (caureju, vemšanu).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi (kucēni un jauni suņi līdz viena gada vecumam).

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

*Devas un ārstēšanas grafiks*

Vienreizējai lietošanai iekšķīgi 15 mg/kg ķermeņa svara febantela un 5 mg/kg ķermeņa svara pirantela (embonāta veidā), kas atbilst 14,4 mg/kg pirantela embonāta, kas atbilst 1 ml/kg ķermeņa svara.

Iespējamās intrauterīnās un transmammārās invāzijas dēļ suņi var invadēties ar cērmēm jau ļoti agrā vecumā. Dažiem dzīvniekiem, īpaši smagas invāzijas gadījumā, nevar pilnībā iznīcināt cērmes, līdz ar to saglabājas invāzijas risks cilvēkiem. Ja epidemioloģiskā situācija atļauj, ieteicams ārstēšanu uzsākt 2 nedēļu vecumā un atkārtot piemērotos laika intervālos (piemēram, ik pēc 2 nedēļām) līdz kucēnu atšķiršanai. Citos gadījumos ārstēšanu veikt pēc invāzijas apstiprināšanas, piemēram, pēc fekāliju paraugu izmeklēšanas.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Veterinārās zāles dzīvniekam var dot tieši mutē vai iemaisīt barībā. Nav nepieciešamas īpašas izmaiņas barošanā. Pirms vajadzīgās devas nomērīšanas veterinārās zāles saskalināt, apvēršot flakonu.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neatvērtām veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Pēc atvēršanas uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz marķējuma un kartona iepakojuma pēc EXP. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 12 nedēļas.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Pēc konkrētu vienas grupas prettārpu līdzekļu biežas un atkārtotas lietošanas var attīstīties parazītu rezistence pret šo prettārpu līdzekļu grupu.

Veterināro zāļu lietošanas drošums nav noteikts kucēniem, kuri jaunāki par 2 nedēļām un ar svaru mazāku nekā 0,600 kg.

Nelietot grūsnām un laktējošām kucēm.

Lietojot pirantelu (spastiskā paralīze) vienlaicīgi ar piperazīnu (neiromuskulārā paralīze) tie darbojas kā antagonisti.

Pēc pieckārtīgi pārsniegtas ieteiktās terapeitiskās devas lietošanas, kucēniem un jauniem suņiem nenovēroja pārdozēšanas klīniskās pazīmes. Desmitkārtīgi palielinot ieteicamo devu, tika novērota pirmā nepanesības pazīme – vemšana.

Brīdinājumi lietotājam:

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Izvairīties no zāļu tiešas saskares ar ādu un acīm. Nejaušas saskares gadījumā nekavējoties skalot skarto vietu ar tīru, tekošu ūdeni.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

10/2020

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Iepakojuma izmērs: 50 ml, 100 ml ar 5 ml šļirci.  
(Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.)

Lietošanai dzīvniekiem.  
Bezrecepšu veterinārās zāles.