

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/00/1059**

**ERY SIN SINGLE SHOT** emulsija injekcijām cūkām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a. s.,  
Komenského 212  
683 23 Ivanovice na Hané,  
Čehijas Republika

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**ERY SIN SINGLE SHOT** emulsija injekcijām cūkām

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena 2 ml deva satur:

**Aktīvā viela:**

Inaktivēta *Erysipelothrix rhusiopathiae* RP  $\geq 1$  \*  
(celms 2-64 serotips 2a, celms 2-5 serotips 2a, celms 2-II serotips 2a, celms 1-203 serotips 1a)

\* Relatīvā potence (RP) - tiek noteikta salīdzinājumā ar atsauces serumā sasniegto pēc peļu vakcinācijas ar vakcīnas sēriju, kura veiksmīgi izturējusi provokācijas testu mērķa sugām.

**Adjuvants:**

Montanide ISA 25VG 0, 5 ml

**Palīgvielas :**

Formaldehīda 35% šķīdums maks. 3, 8 mg  
Tiomersāls 0, 2 mg

Balta līdz pelēcīgi balta emulsija ar iespējamām nogulsnēm.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Cūku aktīvai imunizācijai pret sarkanguļas ierosinātāju *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

Imunitātes iestāšanās: 21 diena.

Imunitātes ilgums: 6 mēneši.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Vakcinēt tikai klīniski veselas cūkas. Nelietot sivēnmātēm 2 nedēļas pirms un 4 nedēļas pēc dzemdībām un sivēniem līdz 8 nedēļu vecuma.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Ļoti bieži 2–4 stundu laikā pēc vakcinācijas iespējama pārejoša temperatūras paaugstināšanās vienlaicīgi ar barības uzņemšanas samazināšanos un miegainību, kas parasti pazūd 24–36 stundu laikā.

Ļoti bieži injekcijas vietā var rasties lokāla reakcija sīku fibrozu sabiezinājumu veidā, kas parasti pazūd 2–3 nedēļu laikā.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Cūkas.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Subkutānai lietošanai.

Deva: ievadīt vienu vakcīnas devu -2 ml.

Primārā vakcinācija:

Vakcinēt no 8 nedēļu vecuma.

Revakcinācija:

Atkārtoti vakcinēt ik pēc 6 mēnešiem.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Pirms lietošanas flakonu sakratīt.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2 °C – 8 °C)

Sargāt no sasalšanas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai  
Lietotājam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Nejaušas injicēšanas gadījumā/pašinjicēšanas gadījumā var rasties pietūkums un stipras sāpes, jo īpaši, ja šīs veterinārās zāles injicētas pirkstā vai locītavā; retos gadījumos, ja atbilstoša medicīniskā palīdzība nav sniegta, persona var zaudēt skarto pirkstu.

Ja Jūs nejauši esat injicējis šīs veterinārās zāles sev, vērsieties pie ārsta pat tad, ja nejauši injicēts ļoti mazs zāļu daudzums, un uzrādiet ārstam šo zāļu lietošanas instrukciju.

Ja sāpes ilgst vairāk par 12 stundām pēc ārsta apskates, vērsieties pie ārsta atkārtoti.

Ārstam:

Šīs veterinārās zāles satur minerāleļļu. Pat tad, ja nejauši injicēts neliels šo veterināro zāļu daudzums, var rasties stiprs pietūkums, kā rezultātā var rasties išēmiskā nekroze vai pat persona var zaudēt pirkstu.

Vajadzīga prasmīga, NEATLIEKAMA ķirurģiska iejaukšanās, un var būt nepieciešama savlaicīga injekcijas vietas uzgriešana un skalošana, īpaši, ja skarts pirksta gals vai cīpsla.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnām sivēnmātēm 2 nedēļas pirms un 4 nedēļas pēc dzemdībām.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ievadot dubultu vakcīnas devu blakusparādības mērķa sugām nenovēro.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

07/2018

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Tikai praktizējošam veterinārārstam.

**Iepakojums:** 5 × 20 ml, 1 × 100 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.