

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/08/1593
Ezeepour 25 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai liellopiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close,
Tallaght, Dublin 24
Īrija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ezeepour 25 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai liellopiem
Cypermethrinum

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Cipermetrīns (93%) (cis/trans izomēri 50:50) 25 mg

Palīgvielas:

Miritols

4. INDIKĀCIJA(-S)

Utu un mušu invāzijas kontrolei.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot teļiem, kas jaunāki par 7 dienām.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažiem dzīvniekiem 48 stundas pēc šķīduma lietošanas dzīvniekiem var novērot viegli izteiktas diskomforta pazīmes. Šīs blakusparādības ir pārejošas, un tām nepiemīt ilgstoša iedarbība.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ārīgai lietošanai.

Noņemiet vāciņu no kameras un iespiediet kamerā vajadzīgo zāļu daudzumu, un atbilstoši norādījumiem uzklājiet zāles uz dzīvnieka ādas.

Utu invāzijas kontrolei

Utu invāzijas kontrolei parasti pietiek ar vienreizēju 10 ml devu. Nelielai daļai dzīvnieki dažas utis var izdzīvot. Ja invāzija ir liela, nepieciešamības gadījumā pēc 4 nedēļām zāles var lietot atkārtoti.

10 ml deva vienmērīgi jāuzklāj no galvas kaudālās daļas līdz astes saknei.

Mušu invāzijas kontrolei

Sākoties mušu sezonai, apstrādājiet dzīvniekus ar vienreizēju 10 ml devu, ko pēc tam atkārtoti ar 5 - 8 nedēļu intervālu. Tomēr lietošanas biežums var variēt atkarībā no invāzijas apjoma un veida.

10 ml deva vienmērīgi jāuzklāj rajonā no galvas kaudālās daļas līdz astes saknei.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Sk. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes".

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un subproduktiem: 10 dienas.

Pienam: nulle dienas.

Govis jāapstrādā tūlīt pēc slaukšanas, lai būtu pēc iespējas ilgāks laika periods līdz nākamajai slaukšanas reizei.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ezeepour jālieto vietā, kur ir laba ventilācija.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, jāizmanto individuālais aizsargtērps un gumijas cimdi.

Izvairīties no zāļu saskares ar acīm un ādu. Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Ezeepour lietošanas laikā aizliegts ēst, dzert vai smēķēt. Tūlīt pēc lietošanas mazgāt rokas un citus ādas apvidus, uz kuriem nokļuvis šķīdums.

Grūsnība un laktācija:

Cīpermetrīna aktivitāte pēc iekšķīgas lietošanas ir zema; transdermālas resorbcijas iespējamība ir ļoti minimāla.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Nepārdozēt. Pārdozēšanas gadījumā norādītais ierobežojumu periods piena un gaļas izmantošanai cilvēku uzturā nav spēkā.

Nesaderība:

Ezeepour nav saderīgs ar sārmainiem materiāliem.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ezeepour nedrīkst nonākt ūdenstīpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.