

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/01/1369

**Fatroximín** 300mg/4,0g pesāriji ievadīšanai dzemdē govīm, ķēvēm, sivēnmātēm un mazajiem atgremotājiem

### 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 – Ozzano dell'Emilia (Bologna), Itālija

### 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Fatroximín** 300mg/4,0g pesāriji ievadīšanai dzemdē govīm, ķēvēm, sivēnmātēm un mazajiem atgremotājiem

*Rifaximin*

### 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs pesārijs (4,0 g) satur-

**Aktīvā viela:**

Rifaksimīns 300 mg

**Palīgvielas:** līdz 4,0g

### 4. INDIKĀCIJA(-S)

Govīm, ķēvēm, sivēnmātēm un mazajiem atgremotājiem bakteriālas izcelsmes dzimumorgānu infekciju profilaksei un ārstēšanai: metrīts, endometrīts, cervicīts, vulvovaginīts, pēcdzemdību sepse, nometekļa aizture, manuāla vai ķirurģiska iejaukšanās aprūtinātu dzemdību gadījumā.

### 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

### 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbība, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

### 7. MĒRĶA SUGAS

Govis, ķēves, sivēnmātes un mazie atgremotāji.

### 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Ievadīšanai dzemdē.

Devas govīm un ķēvēm: metrīta, endometrīta, cervicīta gadījumos: 4 pesārijus vienu reizi vai 2 + 2 pesārijus ar 24 stundu intervālu. Vulvovaginīta gadījumos: 1 + 1 pesārijs ar 24 stundu intervālu. Nometekļa aiztures gadījumos: 4 pesārijus vienu reizi.

Devas sivēnmātēm un mazajiem atgremotājiem: metrīta, endometrīta, cervicīta, vulvovaginīta gadījumos – 2 pesārijus vienu reizi vai 1 + 1 pesāriju ar 24 stundu intervālu. Nometekļa aiztures gadījumos – 2 pesārijus vienu reizi. Pēcdzemdību palīdzības sniegšanas gadījumā – 1 pesāriju vienu reizi.

Ja nometekļa aiztures gadījumā, atdalīšanās nenotiek 12-24 stundu laikā pēc ārstēšanas, dzemdē ievada 2 pesārijus.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Skat. 8. punktā.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam Nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt tumšā, sausā vietā istabas temperatūrā.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Nav.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

10/2015

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma veidi:

Kartona kārba ar 12 pesārijiem un vienreizlietojamie cimdi.

Kartona kārba ar 36 pesārijiem un vienreizlietojamie cimdi. Ne visi iepakojuma veidi var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

**SIA "Optim Vet"**

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija