

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/97/0545

Furosemide 5% 50 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem

1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Alfasan International BV
Kuipersweg 9
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Nīderlande
Tālr.: 0031-348416945
E-pasts: Alfasan@wxs.nl

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Furosemide 5% 50 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem
Furosemide

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO VIELU UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Furosemīds 50 mg

Palīgvielas:

Nātrija metabisulfīts (E 223)	1 mg
Metilparahidroksibenzoāts (E 219)	1 mg
Propilparahidroksibenzoāts	0,1 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem, suņiem un kaķiem sirds nepietiekamības izraisītas tūskas (plaušu tūska, ascīts); akūtas audu tūskas bez iekaisuma pazīmēm ārstēšanai.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Smagas aknu vai nieru slimības, anūrija, hipovolēmija.
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Liellopiem, zirgiem: intravenozai lietošanai.

Suņiem, kaķiem: intramuskulārai vai intravenozai lietošanai.

Liellopiem, zirgiem: 1-2 ml/100 kg ķermeņa svara divas reizes dienā.

Suņiem, kaķiem: 0,5-1,0 ml/10 kg ķermeņa svara (t.i., 2,5-5 mg/kg) divas reizes dienā.

Ja nepieciešams, devu vai lietošanas intervālu var dubultot.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem un zirgiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Pienam: 2 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C

Neuzglabāt ledusskapī, nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 24 mēneši.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Dzīvniekiem, kas saņem furosemīdu, pirms ķirurģiskām manipulācijām nepieciešams kontrolēt elektrolītu līmeni.

Grūsnība un laktācija:

Nav ieteicams lietot dzīvniekiem grūsnības otrajā trimestrī.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Piesardzīgi lietot dzīvniekiem, kuri tiek ārstēti ar sirds glikozīdiem, C vitamīnu, urīnvielu, kalcija glukonātu, tetraciklīniem, adrenalīnu, kālija jonus izvadošiem steroīdiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Furosemīds ir stipras iedarbības salurētisks diurētiskais līdzeklis, kas lielās devās var izraisīt organisma dehidratāciju un elektrolītu disbalansu, kuru novērš ar atbilstošu šķīdumu terapiju.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

08/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Lietošanai dzīvniekiem.

Iepakojums:

50 ml brūns stikla (II tipa) flakons. 15 x 50 ml brūni stikla (II tipa) flakoni polistirola kastē.
Vāciņš: brombutila gumijas aizbāznis, kas pārklāts ar alumīnija korķīti.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.