

# HPM DIET CAT UROLOGY DISSOLUTION & PREVENTION

## Struvītu & Oksalātu veidošanās samazināšana un profilakse

Lietošanai dzīvniekiem.

Pilnvērtīga diētiskā barība kaķiem urīnākmēņu - struvītu izšķīdināšanai, oksalātu veidošanās samazināšanai, struvītu atkārtotas veidošanās samazināšanai.

Galvenie barības raksturlielumi: Sekmē ūdens uzņemšanu, zems struvītu indekss RSS (<1), optimizē urīna pH, augsts EPA+DHA (omega-3) daudzums, pievienotas fosfora saistvielas, svara kontrole, zems D3 vitamīna, kalcija un magnija daudzums,

Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromatizētājus, glutēnu, kukurūzu, soju, liellopu produktus, olas.

**Sastāvs:** Dehidrēts cūku un mājputnu proteīns, kartupeļu ciete, hidrolizēts cūku un mājputnu proteīns, dzīvnieku tauki, minerālvielas, lauka pupu apvalki, zirņi, lignoceluloze, rīsi, biešu mīkstums, linsēklas, alus raugs, ceļtekas sēklu šķiedras psyllium, fruktooligosaharīdi, hidrolizēti vēžveidīgie (hitosāna avots), hondroitīna sulfāts, rauga *Lactobacillus acidophilus* kultūra.

Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit. 17000 SV, D3 vit. 1700 SV, E vit. 610 SV, varš 12 mg (vara sulfāts, pentahidrāts), cinks 110 mg (cinka sulfāta monohidrāts), jods 0.4 mg (kālija jodīds), taurīns 2460 mg, L-karnitīns 540 mg.

Tehnoloģiskās piedevas 1 kg: saistviela bentonīts 5g. Antioksidanti.

**Analītiskie komponenti:** kopproteīns 44 % (t.sk. dzīvnieku izcelsmes 90%), kopeļļas un tauki 13.5 %, kopšķiedra 6.5 %, koppelni 7.5 %, ogļhidrāti (NFE, bezslāpekļa ekstraktviela) 23%, ciete 15%, kalciji 0,7%, fosfors 0,7%, nātrijs 1.1%, magnijs 0,08%, kālijs 0,7%, hlorīdi 1,4%, sērs 0,7%, kopējais D vitamīns 1000 SV/kg, hidroksiprolīns 1.8%, metabolizējamā enerģija 374 kcal/100g. Urīna alkalizētāji: kālija citrāts.

Rekomendējamās diennakts barības devas:

Ķermeņa svars (kg)	Dienas deva (g/dienā)		
	Palielināts svars, saudzīga svara samazināšana	Normāls svars *	Samazināts svars
2	20	25	25
3	30	35	40
4	40	45	50
5	50	60	65
6	60	70	75
7	70	80	90
8	80	95	105
9	90	105	115
10	105	115	130

Dienas deva tiek rēķināta, ņemot vērā kaķa esošo svaru un ir jākorģē ik mēnesi.

Kaķim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.

Ieteicamo dienas devu vēlams sadalīt vairākās nelielās barošanas reizēs, ievērojot devas tabulā uz iepakojuma.

Struvītu izšķīdināšanai barību lietot 5-12 nedēļas. Oksalātu veidošanās samazināšanai un struvītu atkārtotas veidošanās samazināšanai, barību sākotnēji lietot līdz 6 mēnešiem. Pirms barības lietošanas vai barības lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Barība nav piemērota augšanas periodā, grūsnības vai laktācijas laikā, hroniskas nieru vai sirds mazspējas gadījumā.

Barības nomainītu veikt pakāpeniski vismaz 7 dienu laikā, proporcionāli samazinot iepriekšējās barības daudzumu un palielinot jaunās barības daudzumu.

Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.

Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.

Fasējums **50 g, 1.5 kg, 3 kg, 7 kg** maisos. Ražotājs: Virbac Nutrition (Francija), atz. Nr. FR 30.341.003.

Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, bar. izpl. Nr. LV 019020