

HPM DIET CAT UROLOGY STRUVITE DISSOLUTION

Struvītu šķīdināšana

Lietošanai dzīvniekiem.

Pilnvērtīga diētiskā barība kaķiem urīnākmēņu - struvītu izšķīdināšanai, (5-12 nedēļas).

Cits pielietojums: Oksalātu veidošanās samazināšanai.

Galvenie barības raksturlielumi: Sekmē ūdens uzņemšanu, zems struvītu indekss RSS (<1), paskābina urīna pH (6,0-6,5), augsts EPA+DHA (omega-3) daudzums, pievienotas fosfora saistvielas, zems magnija daudzums,

Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromatizētājus, glutēnu, kukurūzu, soju, liellopu produktus, olas.

Sastāvs: Dehidrēts cūku un māļputnu proteīns, kartupeļu ciete, hidrolizēts cūku un māļputnu proteīns, dzīvnieku tauki, minerālvielas, zirņi, lauka pupu apvalki, rīsi, biešu mīkstums, linsēklas, alus raugs, zivju eļļa, lignoceluloze, ceļtekas sēklu šķiedras psyllium, fruktooligosaharīdi, hidrolizēti vēžveidīgie (hitosāna avots), hondroitīna sulfāts, rauga *Lactobacillus acidophilus* kultūra.

Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit. 17000 SV, D3 vit. 1700 SV, E vit. 610 SV, varš 12 mg (vara sulfāts, pentahidrāts), cinks 110 mg (cinka sulfāta monohidrāts), jods 0.4 mg (kālija jodīds), taurīns 2460 mg, L-karnitīns 540 mg. Zootehniskas piedevas: amonija hlorīds 2 g/kg.

Tehnoloģiskās piedevas 1 kg: saistviela bentonīts 5g. Antioksidanti.

Analītiskie komponenti: kopproteīns 44 % (t.sk. dzīvnieku izcelsmes 90%), kopēļļas un tauki 16 %, EPA+DHA 0,3 %, kopšķiedra 4 %, koppelni 7.5 %, ogļhidrāti (NFE, bezslāpekļa ekstraktviela) 23%, ciete 15%, kalcijs 0,65%, fosfors 0,65%, nātrijs 1.3%, magnijs 0,08%, kālijs 0,7%, hlorīdi 1.8%, sērs 0,7%, metabolizējamā enerģija 397 kcal/100g.

Rekomendējamās diennakts barības devas:

Ķermeņa svars (kg)	Dienas deva (g/dienā)		
	Palielināts svars	Normāls svars	Samazināts svars
2	20	20	25
3	30	35	35
4	40	45	50
5	50	55	60
6	60	65	75
7	70	75	85
8	75	85	95
9	85	100	110
10	95	110	120

Dienas deva tiek rēķināta, ņemot vērā kaķa esošo svaru un ir jākorrigē ik mēnesi.

Kaķim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.

Ieteicamo dienas devu vēlams sadalīt vairākās nelielās barošanas reizēs, ievērojot devas tabulā uz iepakojuma.

Struvītu šķīdināšanai barību lietot 5-12 nedēļas. Pirms barības lietošanas vai barības lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Barība nav piemērota augšanas periodā, grūsnības vai laktācijas laikā, hroniskas nieru vai sirds mazspējas gadījumā.

Barības nomaiņu veikt pakāpeniski vismaz 7 dienu laikā, proporcionāli samazinot iepriekšējās barības daudzumu un palielinot jaunās barības daudzumu.

Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.

Barības sēriju un minimālo derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma.

Fasējums **50 g, 1.5 kg, 3 kg** maisos.

Ražotājs: Virbac Nutrition (Francija), atz. Nr. FR 30.341.003.

Izplata: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, bar. izpl. Nr. LV 019020