

HPM DIET DOG URINARY DISSOLUTION & PREVENTION

Struvīti & Oksalāti

Lietošanai dzīvniekiem.

Pilnvērtīga diētiskā barība suņiem urīnakmeņu - struvītu izšķīdināšanai un atjaunošanās novēršanai, oksalātu veidošanās samazināšanai un profilaksei.

Galvenie barības raksturlielumi: Sekmē ūdens uzņemšanu, zems struvītu indekss RSS (<1), optimizē urīna pH, augsts EPA+DHA (omega-3) daudzums, zems kalcijs & fosfors daudzums, ierobežots augstas kvalitātes proteīna daudzums.

Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromatizētājus, glutēnu, kukurūzu, soju, liellopu produktus, olas.

Sastāvs: Dehidrēts cūku un mājputnu proteīns, rīsi, dzīvnieku tauki, zirņi, kartupeļu ciete, hidrolizēts cūkas un mājputnu proteīns, minerālvielas, kartupeļu proteīns, lignoceluloze, lauka pupu apvalki, biešu mīkstums, linsēklas, zivju eļļa, ceļtekas sēklu šķiedras psyllium, fruktooligosaharīdi, alus raugs, rauga *Lactobacillus acidophilus* kultūra, hondroitīna sulfāts.

Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: A vit. 11000 SV, D3 vit. 1100 SV, E vit. 570 SV, dzelzs 25 mg (dzelzs (II) sulfāts, monohidrāts), varš 15 mg (vara sulfāts, pentahidrāts), cinks 120 mg (cinka sulfāta monohidrāts), jods 1.1 mg (kālija jodīds), L-karnitīns 330 mg.

Tehnoloģiskās piedevas 1 kg: saistviela bentonīts 5g. Antioksidanti.

Analītiskie komponenti: kopproteīns 34 % (t.sk. dzīvnieku izcelsmes 85%), kopeļļas un tauki 17.5 %, EPA + DHA 0,4%, kopšķiedra 5 %, koppelni 7 %, ogļhidrāti (NFE, bezslāpekļa ekstraktviela) 27.5%, ciete 22%, kalcijs 0,8%, fosfors 0,6%, nātrijs 0.9%, magnijs 0,08%, kālijs 0,7%, hlorīdi 1,4%, sērs 0,7%, kopējais D vitamīns 700 SV/kg, hidroksiprolīns 1.3%, metabolizējamā enerģija 374 kcal/100g. Urīna alkalizētāji: kālija citrāts.

Rekomendējamās diennakts barības devas:

Ķermeņa svars (kg)	Dienas deva (g/dienā)		
	Palielināts svars	Normāls svars	Samazināts svars
5	90	110	120
8	120	150	165
10	140	175	190
15	185	230	250
20	220	275	305
25	255	320	355
30	290	365	400
40	350	440	485
60	460	575	635

Dienas deva tiek rēķināta, ņemot vērā suņa ESOSO svaru un ir jākorrigē ik mēnesi. Pieļaujams novērot palielinātu ūdens uzņemšanu un palielinātu urīna apjomu.

Sunim pastāvīgi nodrošināt pieejamu svaigu dzeramo ūdeni.

Ieteicamo dienas devu vēlams sadalīt vairākās nelielās barošanas reizēs, ievērojot devas tabulā uz iepakojuma.

Struvītu izšķīdināšanai barību lietot 5-12 nedēļas. Struvītu atjaunošanās samazināšanai un oksalātu veidošanās samazināšanai - barību sākotnēji lietot līdz 6 mēnešiem. Pirms barības lietošanas vai barības lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Barība nav piemērota augšanas periodā, grūsnības vai laktācijas laikā, hroniskas nieru vai sirds mazspējas gadījumā.

Barības nomaiņu veikt pakāpeniski vismaz 7 dienu laikā, proporcionāli samazinot iepriekšējās barības daudzumu un palielinot jaunās barības daudzumu.

Barību uzglabāt sausā, tumšā, vēsā vietā, iepakojumu vienmēr turēt noslēgtu.

Barības sēriju un minimālo glabāšanas termiņu skatīt uz iepakojuma.

Fasējums **100 g, 3 kg, 12 kg** maisos. Ražotājs: Virbac Nutrition (Francija), atz. Nr. FR 30.341.003.

Izplatītājs: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga, LV1002; tālr. 80000060, bar. izpl. Nr. LV 019020