

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Incurin

1mg tabletēs

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Incurin 1 mg tabletēs

Estriol

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Aktīvā viela: Estriols 1 mg/tablete

Apaļas tabletēs ar sadalošo līniju.

4. INDIKĀCIJAS

Incurin ir indicēts hormonu atkarīgās urīna nesaturēšanas ārstēšanai, sfinktera mehānisma mazspējas dēļ, kucēm pēc ovariohisterektomijas.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot nesterilizētām kucēm, jo efektivitāte ir noteikta tikai kucēm pēc ovariohisterektomijas.

Nelietot Incurin, ja dzīvniekiem ir poliūrijas-polidipsijas sindroma simptomi.

Nelietot Incurin grūsnības, laktācijas laikā un dzīvniekiem jaunākiem par 1 gadu.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lietojot lielākajā norādītajā devā 2 mg/sunim, tika novēroti estrogēnie efekti, tādi kā uztūkusi vulva, piebrieduši piena dziedzeri un/vai pievilcība vīriešu kārtas suņiem un vemšana. Sastopamība aptuveni 5-9%. Pēc devas samazināšanas šie simptomi ir atgriezeniski.

Retos gadījumos novēroja asiņošanu no vagīnas. Retos gadījumos novēroja arī alopēcijas veidošanos.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Incurin ir paredzēts iekšķīgai lietošanai vienreiz dienā.

Nav noteikta attiecība starp fināla efektīvo devu un ķermeņa svaru, līdz ar to deva ir jānosaka katram sunim individuāli.

Ieteicams šāds dozēšanas grafiks: ārstēšanu uzsāk ar 1 tabletu (1mg estriola) katra dienu. Ja ārstēšana ir veiksmīga, devu samazina līdz puse tabletēs dienā. Ja sākuma ārstēšana nav veiksmīga, palielina devu līdz 2 tabletēm dienā, kuru dod vienā reizē. Dažiem suņiem nav nepieciešama ikdienas lietošana; var mēģināt ārstēt katru otro dienu, līdz tiek noteikta minimālā efektīvā deva.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav piemērojami.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un nerēdzamā vietā.

Neuzglabāt temperatūrā virs 30°C.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš (EXP), kurš norādīts markējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Estrogēniem lielās devās piemīt audzēju stimulējoša ietekme uz mērķaudiem ar estrogēnu receptoriem (piena dziedzeri).

Pārdozēšanas gadījumā novēro tipiskus estrogēnos simptomus. Šie simptomi ir atgriezeniski pēc devas samazināšanas.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Katrs blisters satur 30 tabletēs. Katrs blisters ir iepakots kartona kārbā.

Estriols ir īslaicīgas darbības dabīgais estrogēns. Tam piemīt dziedinoša iedarbība uz urīna nesaturēšanu kucēm. Pēc iekšķīgas lietošanas otrajā ārstēšanas dienā tiek sasniegts stabils stāvoklis un pēc vairākkārtīgas iekšķīgas lietošanas nenovēro akumulāciju. Pateicoties savai īslaicīgai darbībai, estriols neizraisa kaulu smadzeņu nomākumu suņiem.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.