

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/08/1595

Jodofoam Endofoam A.U.V. intrauterīnās putas govīm

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Tolnagro Ltd.
7100 Szekszárd
Rákóczi u. 142-146
Ungārija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Pernix Pharma Pharmaceutical Manufacturing Ltd.
8900 Zalegerszeg, Biro M.U. 38
Ungārija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Jodofoam Endofoam A.U.V. intrauterīnās putas govīm

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 aerosola flakons (45,2 g) satur:

Aktīvās vielas:

| | |
|---------------|--------|
| Jods | 200 mg |
| Kālija jodīds | 400 mg |

Palīgvielas:

Nesējviela (indeferenta propāna/butāna gāze) līdz 45,2 g/flakonā.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Dažādu pakāpju metrītu (akūta katarāla endometrīta, hroniska gļotaini strutojoša endometrīta, hroniska strutojoša endometrīta, piometras) ārstēšanai govīm.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret jodu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Blakusparādības ir reti un tās ir saistītas ar govju individuālu jutību pret jodu. Nav pieejama informācija par joda sistēmisku toksicitāti pēc intrauterīnas lietošanas.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Intrauterīnai lietošanai.

Atkarībā no metrīta pakāpes un simptomu nopietnības lietot 2-3 reizes ar nedēļas intervālu. Putas ievadīt ar sterilu katetru, kas fiksēts uz aerosola flakona.

Ievadīt vienu devu jeb visu viena flakona saturu. Nepieciešamības gadījumā ārstēšanu atkārtot 2 vai 3 reizes ar vienas nedēļas intervālu.

Ja ir piometra, nepieciešamības gadījumā var lietot 2 flakonu saturu vienā reizē.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pēc ārējo dzimumorgānu dezinfekcijas lietot šādi: ar vienu roku rektāli fiksēt dzemdes kaklu, ar otru roku ievadīt katetru caur vagīnu dzemdē. Tad pievienot flakonu katetram.

Katetru var ievietot arī ar Albrehtsena metodi. Ja dzemdes kakls ir fiksēts ar Albrehtsena tipa ķirurģiskajām knaiblēm un ir ievilkts vagīnā, katetru ievadīt tieši dzemdes kaklā.

Ja flakons ir auksts, tā satura izvadīšana var būt apgrūtināta. Šajā gadījumā flakonu ieteicams uzsildīt līdz ķermeņa temperatūrai, bet uzsildīšanai nelietot karstu ūdeni.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt sausā vietā temperatūrā no 5 °C līdz 25°C. Sargāt no gaismas. Sargāt no sasalšanas.

Flakons ir viegli uzliesmojošs un zem spiediena, tādēļ nepārdurt un nededzināt pat tukšu flakonu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Pēc ārstēšanas nemasēt dzemdi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret jodu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Izvairīties no tiešas saskares ar ādu. Ja notikusi saskare ar ādu, skalot skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu.

Flakons ir viegli uzliesmojošs un zem spiediena, tādēļ nepārdurt un nededzināt pat tukšu flakonu. Turēt drošā attālumā un neizsmidzināt atklātas liesmas tuvumā vai uz karstiem priekšmetiem. Lietot tikai labi vēdināmās telpās. Lietošanas laikā neizsmidzināt uz citām personām.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības laikā. Drīkst lietot laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšana nav iespējama, jo flakons satur vienu devu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2021

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojumā 10 x 1 aerosola flakons.

Kartona kastītē aerosola flakoni ir komplektā ar vienreizējai lietošanai paredzētu sterilu katetru un savienojumu.