

KALCILIS MAG

Dietinis pašaru papildas pieninēms karvēm

Diētiskā papildbarība slaucamām govīm

480 ml

LT

Gelis paredzēts po atsivedimo rizikai mažinti

Esminēs maistinės savybės: didelis kalcio kiekis (iš lengvai pasisavinamų kalcio druskų).

Vartojimo instrukcija

Prieš vartojimą gerai suplakiti.

Rekomenduojama sugirdyti gelio 3 kartus po butelį tokia seka:

- 12 val. prieš veršiavimąsi;
- tuoj po apsiveršiavimo;
- 12 val. po apsiveršiavimo.

Vyresnėms kaip 2 laktacijų karvėms, linkusioms sirgti pareze po atsivedimo, rekomenduojama sugirdyti:

- butelį gelio likus 24 val. iki veršiavimosi;
- butelį gelio likus 6 – 10 val. iki veršiavimosi;
- dar vieną butelį gelio tuoj po apsiveršiavimo.

Jei karvė buvo gydyta kalcio preparatais į veną, rekomenduojama sugirdyti gelio du kartus po butelį, pirmą kartą ne anksčiau kaip 6 val. po gydymo, antrą kartą – dar po 6 val. (12 val. po gydymo į veną).

Preparato negirdyti gyvuliams be sąmonės arba sutrikus rijimui, kad nepatektų į kvėpavimo takus.

Prieš naudojant pašarus arba prieš pratęsiant jų naudojimo laikotarpį reikėtų pasikonsultuoti su mitybos specialistu arba veterinaru.

Sudėtis: kalcio chloridas, magnio chloridas, kalio chloridas.

Kalcio chloridas – 46,07 % (atitinka 8,6 g kalcio 100 g produkto)

LV

Gels piena triekas riska mazināšanai

Barības būtiskās īpašības: augsts kalcija saturs viegli asimilējamu kalcija sāļu veidā.

Lietošanas instrukcija.

Pirms lietošanas kārtīgi saskalot!

Gelu ieteicams izbarot 3 reizes pa 1 pudelei (480 ml) šādā secībā:

- 12 stundas pirms atnešanās,
- otro pudeli - uzreiz pēc atnešanās,
- vēl 1 pudeli - 12 stundas pēc atnešanās.

Otrās laktācijas un vecākām govīm, kurām ir nosliece uz pēcdzemdību parēzi, ieteicams gelu izbarot šādā secībā:

- pudeli gela 24 stundas pirms atnešanās,
- otro pudeli gela 6 - 10 stundas pirms atnešanās,
- vēl 1 pudeli gela - uzreiz pēc atnešanās.

Ja govys ir ārstēta ar kalcija preparātiem intravenozi, ieteicams gelu izbarot 2 reizes pa 1 pudelei: pirmo reizi - ne agrāk kā 6 stundas pēc ārstēšanas, otro reizi – vēl pēc 6 stundām (12 stundas pēc intravenozās ārstēšanas).

Preparātu nedrīkst barot lopiem, kuri ir zaudējuši samaņu vai kuriem ir rīšanas traucējumi, lai tas neiekļūtu dzīvnieka elpvados.

Pirms barības lietošanas vai lietošanas ilguma pagarināšanas, ieteicams konsultēties ar uztura speciālistu vai veterinārārstu.

Sastāvs: kalcija hlorīds, magnija hlorīds, kālija hlorīds.

Kalcija hlorīds - 46,07 % (100 g produkta atbilst 8,6 g kalcija).

<p>Analinės sudedamosios dalys (%): Žali baltymai < 0,1 % Žalia ląsteliena < 0,6 % Neapdoroti aliejai ir riebalai < 0,1 % Žali pelenai 24,67 % Kalcis 8,6% Natris 0,04% Fosforas < 0,1 % Magnis 0,6% Kalis 0,22% Chloras 16,8% Drėgnis 64,05%</p> <p>Priedai (g/1 kg): Technologiniai priedai: stabilizatorius - natrio karboksimetilceliuliozė (E 466) - 3,24 g</p> <p>Laikyti tamsioje vietoje, 16 - 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo vaikų. GAMINTOJAS: UAB "RUVERA", Žemaitės g. 145, LT-76139 Šiauliai, Lietuva, t. +370 41 598123, realizacija@ruvera.lt r LT KPG 99607 Serija: Geriausias iki:</p>	<p>Analitiskie komponenti (%): Koproteins < 0,1 % Kokškie dra < 0,6 % Kopelļas un tauki < 0,1 % Koppelni 24,67 % Kalcijš 8,6 % Nātrijš 0,04 % Fosfors < 0,1 % Magnijš 0,6 % Kālijš 0,22 % Hlors 16,8 % Mitrumš 64,05 %</p> <p>Piedevas (g/1 kg): Tehnoloģiskās piedevas: stabilizētāji – karboksimetilcelulozes nātrija sāļš (E 466) - 3,24 g</p> <p>Uzglabāt tumšā vietā, 16°C - 25°C temperatūrā. Glabāt bērniem nepieejamā vietā!</p> <p>Ražotājs: UAB "Ruvera", Žemaitės g. 145, LT-76139 Šiauliai, Lietuva, t +370 41 598123, realizacija@ruvera.lt r LT KPG 99607 Sērija: Derīgs līdz:</p>
--	--

Nauja etiketės redakcija (2017 04). Kalcilis Mag 480ml. 65x222 mm.