

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/02/1492

Killitam Drops 15 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (BO), Itālija.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Killitam Drops 15 mg/ml pilieni iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem
Acepromazine

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma satur-

Aktīvā viela:

Acepromazīns(acepromazīna maleāta formā) 15 mg

Palīgvielas:

Nātrijs metilparahidroksibenzoāts

Nātrijs propilparahidroksibenzoāts

Citas palīgvielas līdz 1 ml.

4. INDIKĀCIJAS

Killitam Drops ir paredzēts suņu un kaķu trankvilizācijai un sedācijai šādos gadījumos:

- izstāžu laikā, kad dzīvnieki tiek apcirpti, sagūstīti u.c. gadījumos.;
- vemšanas novēršanai un dzīvnieka nomierināšanai transportēšanas laikā;
- satrauktiem un agresīviem dzīvniekiem (it īpaši, meklēšanās laikā);
- grūti savaldāmiem dzīvniekiem diagnostiskās un rentgenoloģiskās izmeklēšanas veikšanai;
- svešķermeņa izņemšana u.c. gadījumos, kas var izraisīt dzīvnieka satraukumu;
- iesākuma sedācijai nelielu ķirurģisko manipulāciju vai lokālās/reģionālās anestēzijas gadījumā;
- narkozes premedikācijai;
- viltus grūsnības, kanibālisma gadījumos u.c.;
- dermatīta, kuru pavada ilgstoša nieze (neirodermatīts), gadījumos;
- neirotiska anoreksija (devu sadalīt divās daļās).

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Fenotiazīna atvasinājumus nedrīkst lietot fosforskābes esteru intoksikācijas izraisītu nervu sistēmas darbības traucējumu klīnisko simptomu ārstēšanai.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Acepromazīns var izraisīt hipotenziju, hipotermiju, sirdsdarbības un respiratoro mazspēju, midriāzi, aptiālismu (siekalu trūkums), vemšanu, hematoloģisko rādītāju izmaiņas un retos gadījumos izraisa paradoksālu iedarbību - dezorientāciju, satraukumu, gaudošānu, agresivitāti un konvulsijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Pilieni iekšķīgai lietošanai. 1ml atbilst 45 pilieniem (15mg acepromazīna).

Deva ir atkarīga no nepieciešamās sedācijas/trankvilizācijas pakāpes. Parasti veciem un lieliem dzīvniekiem ir nepieciešama mazāka deva uz kg ķermeņa svara, līdz ar to, veciem un lieliem dzīvniekiem lietot zemākās norādītās devas.

Tā kā acepromazīns iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, ir iespējamās dažādas individuālas farmakoloģiskās atbildes reakcijas. Tāpēc vispirms lietot zemāko vai vidējo norādīto devu, kuru palielina tikai pēc farmakoloģiskā efekta novērtēšanas.

Killitam Drops lieto iekšķīgi devā 0,5 – 3 mg acepromazīna/kg ķermeņa svara suņiem un 1,5 – 4,5 mg/kg ķermeņa svara kaķiem saskaņā ar zemāk norādīto:

	Deva suņiem	Deva kaķiem
<i>Killitam drops</i>	0,03-0,2ml/kg (aptuveni 1-9 pilieni/kg)	0,1-0,3ml/kg (aptuveni 5-14 pilieni/kg)

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Dzīvniekiem ir jābūt brīvai pieejai dzeramam ūdenim vai ar to ir jānodrošina pārvadāšanas laikā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Hipotenzīvā efekta dēļ, acepromazīnu zemākās devās lieto dzīvniekiem, kuri pakļauti stresam, novājējušiem, hipovolēmiskiem dzīvniekiem, šoka stāvoklī, sirds slimību gadījumos, vai veciem dzīvniekiem.

Acepromazīna farmakoloģiskais efekts ir atkarīgs no lietotās devas, dzīvnieka temperamenta, fiziskās kondīcijas, šķirnes, svara un vecuma. Liela un milzīga auguma šķirņu suņi (piemēram, ņūfaundlendi, kurti) ir daudz jutīgāki pret acepromazīnu nekā maza auguma suņi (piemēram, terjeri), pat ja tas tiek lietots lielās devās.

Brahiocefāliskās šķirnes (pekinieši, bokseri u.c.) ar ievērojamu nervus vagus tonusu var ciest no kardiorespiratorās mazspējas, to var kavēt lietojot acepromazīnu mazās devās kopā ar atropīnu.

Acepromazīns var izmainīt hematoloģiskos rādītājus (leikēmija, trombocitopēnija, eritropēnija ar sekojošu hematokrīta līmeņa samazināšanos, kuru izraisa īslaicīga asins šūnu aizture liesā). Tas jāņem vērā veicot ar acepromazīnu ārstēto dzīvnieku hematoloģisko izmeklēšanu.

Agresīvas idiosinkrātiskās reakcijas ir retas, tomēr, pirmo reizi lietojot acepromazīnu, ieteicams dzīvnieku neatstāt vienu vai kopā ar citiem dzīvniekiem vai bērniem.

Dzīvniekiem ir jābūt brīvai pieejai dzeramam ūdenim vai ar to ir jānodrošina pārvadāšanas laikā.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc lietošanas mazgāt rokas un ādas atklātās vietas. Ja notikusi nejauša iekļūšana acīs vai uz gļotādām, skalot uzmanīgi zem tekoša ūdens un, ja novēro jebkādu kairinājumu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Nejaušas norīšanas gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Izvairīties no iekļūšanas acīs. Iespējamās sedatīvās iedarbības dēļ nedrīkst vadīt transporta līdzekļus.

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā

Acepromazīns neizraisa auglim vispārīgus nevēlamus efektus, izņemot vieglu respiratoro nomākumu jaunpiedzimušiem dzīvniekiem.

Nav pieejamu ziņu par acepromazīna nekaitīgumu grūsnības vai laktācijas periodā. Ieteicams šīs zāles lietot tikai nepieciešamības gadījumā un veterinārārsta uzraudzībā.

Mijiedarbība ar citām zālēm

Nelietot adrenalīnu, lai novērstu acepromazīna izraisīto hipotenzīvo iedarbību. Acepromazīns pastiprina gāzes vai šķidro narkozes (piemēram, barbiturāti, ksilazīns, ketamīns) un lokālās anestēzijas (prokaīns) līdzekļu darbību.

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

Pārdozēšana un antagonisti

Acepromazīnam nav specifisku antagonistu, tomēr tā izraisīto blakusiedarbību, galvenokārt kardiorespiratoro (piemēram, hipotenzija, kardiorespiratorā mazspēja u.c.), var novērst ar analeptiskiem līdzekļiem, kuri satur doksapramu (5,5-11mg/kg intravenozi), fenilefrīnu vai noradrenalīnu. Adrenalīnu nedrīkst pielietot.

Paradoksālas iedarbības rezultātā, piemēram, agresivitātes, satraukuma, konvulsiju gadījumā, lieto trankvilizatorus vai anestēzijas līdzekļus, tādus kā diazepāms, pentotāls, ketamīns u.c.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 20 ml.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija