

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/DCP/18/0062

Menbutil 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem, aitām un kazām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Vācija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Vācija

Industrial Veterinaria, S.A.
Esmeralda 19
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Menbutil, 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem, aitām un kazām
Menbutone

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs ml satur:

Aktīvā viela:

Menbutons 100,0 mg

Palīgvielas:

Hlorkrezols 2,0 mg

Nātrija metabisulfīts (E 223) 2,0 mg

Dzidrs, gaiši iedzeltens šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Aknu un gremošanas sistēmas funkciju stimulēšanai gremošanas traucējumu un aknu mazspējas gadījumā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot dzīvniekiem ar sirds slimībām vai grūsnības vēlinā stadijā.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc intravenozas ievadīšanas iespējama siekalošanās, acu asarošana, trīce, spontāna urinācija un defekācija.

Pēc intramuskulāras ievadīšanas var rasties reakcijas injekcijas vietā (tūska, hemorāģija, nekroze). Dažkārt novērojams nemiers un paātrināta elpošana.

Retos gadījumos iespējama pārejoša gulēšana, īpaši liellopiem un pēc ātras intravenozas injekcijas.

Ļoti retos gadījumos var rasties anafilaktiskas reakcijas, kuras jāārstē simptomātiski.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus)..

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā, kas atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē www.pvd.gov.lv

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas, zirgi, aitas un kazas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Teļiem (līdz 6 mēnešu vecumam), aitām, kazām un cūkām:

10 mg menbutona uz kg ķermeņa svara (ķ.sv.), ko ievada dziļas intramuskulāri., vai lēnas intravenozas injekcijas veidā, kas atbilst 1 ml šķīduma injekcijām uz 10 kg ķ.sv.

Liellopiem:

5 - 7,5 mg menbutona uz kg ķ.sv. lēnas intravenozas injekcijas veidā, kas atbilst 1 ml šķīduma injekcijām uz 15 - 20 kg ķ.sv.

Zirgiem:

2,5 - 5 mg menbutona uz kg ķ.sv. lēnas intravenozas injekcijas veidā, kas atbilst 1 ml šķīduma injekcijām uz 20 - 40 kg ķ.sv.

Ja nepieciešams, zāļu lietošanu var atkārtot vienu reizi 24 stundu laikā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ieteicama lēna, intravenoza ievadīšana (ne ātrāk kā 1 minūtē), lai izvairītos no blakusparādībām, kas minētas sadaļā „Iespējamās blakusparādības”.

Intramuskulāri vienā injekcijas vietā ieteicams ievadīt ne vairāk kā 20 ml.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Ieteicama lēna, intravenoza ievadīšana (ne ātrāk kā 1 minūtē), lai izvairītos no blakusparādībām, kas minētas sadaļā „Iespējamās blakusparādības”.

Intramuskulāri vienā injekcijas vietā ieteicams ievadīt ne vairāk kā 20 ml.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Rīkojoties ar šīm zālēm, neēst, nedzert un nesmēķēt.

Nejauša pašinjekcija var izraisīt kairinājumu.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret Menbutonu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība:

Nelietot pēdējā grūsnības trimestrī.

Laktācija:

Šīs veterinārās zāles var lietot dzīvniekiem laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams:

Stingri ievērot noteiktās zāļu devas, jo nav zināmi dati par menbutona lietošanas drošumu. Sirds vadītājsistēmas blokādes gadījumā lietot kardiovaskulāras zāles.

Nesaderība:

Neievadīt kopā ar šķīdumiem, kas satur:

- kalciju,
- prokaīna penicilīnu,
- B vitamīnu kompleksu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

05/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Daudzdevu caurspīdīgs I tipa stikla 100 ml flakons ar brombutila gumijas aizbāzni un valcētiem alumīnija vāciņiem. Kastīte ar 1 x 100 ml vai 12 x 100 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Izplatītājs:

A/S Dimela Veta Latvija
Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads
LV- 2167,
Latvija