

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/02/1494

Metabolase Forte šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām un cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285
Ozzano Emilia (BO)
Itālija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Metabolase Forte šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām un cūkām.

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

D,L- acetilmetionīns	200 mg
Ciānkobalamīns	0,2 mg
L-karnitīna hidrohlorīds (atbilst 50 mg karnitīna)	61,3 mg
Alfa-tokoferola acetāts (atbilst 30 mg α -tokoferola)	33 mg

Palīgvielas:

Benzilspirts	
Citas palīgvielas līdz	1 ml.

4. INDIKĀCIJAS

Uzturošai terapijai šādos gadījumos:

- atveseļošanās periodā pēc pārslimotām infekcijas slimībām;
- neadekvātas ēdināšanas izraisīti barības izmantojamības traucējumi;
- dažādas etioloģijas hepatopātijas;
- hepatopātijas, kuras norisinās ar aknu taukaino infiltrāciju (grūsnības toksēmija aitām, muskulatūras disfunkcija saistībā ar miodistrofiju un nepieciešamību enerģētisko procesu paaugstināšanai; slikts vispārējais veselības stāvoklis);
- kardiopātijas;
- aborta un nometekļa disfunkcijas predisponējošo faktoru novēršanai;
- imūnās sistēmas disfunkcija.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, aitas un cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai lietošanai 1 reizi dienā vismaz 5 dienas pēc kārtas.

Liellopiem, zirgiem un pieaugušām cūkām: 5ml/100kg ķermeņa svara.

Aitām, sivēniem, teļiem un kumeļiem: 0,5-1ml/10kg ķermeņa svara.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt istabas temperatūrā. Sargāt no gaismas. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles

Iepakojuma izmēri: 100ml un 250ml.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"
Mētru iela 6,
Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Latvija