

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/01/1378

Metabolase šķīdums injekcijām mājdzīvniekiem

1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), Itālija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Metabolase šķīdums injekcijām mājdzīvniekiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur -

Aktīvās vielas:

L-karnitīna hidrohlorīds	6,133 mg
(kas atbilst L-karnitīnam 5 mg)	
Tioktīnskābe	0,2 mg
Piridoksīna hidrohlorīds	0,15 mg
Cianokobalamīns	0,03 mg
D,L-acetilmetionīns	20,0 mg
L-arginīns	2,4 mg
L-ornitīna hidrohlorīds	1,532 mg
(kas atbilst L-ornitīnam 1,2 mg)	
L-citrulīns	1,2 mg
L-lizīna hidrohlorīds	0,625 mg
(kas atbilst L-lizīnam 0,5 mg)	
Glicīns	1,5 mg
Asparagīnskābe	1,5 mg
Glutamīnskābi	1,5 mg
Fruktoze	50,0 mg
Sorbīts	80,0 mg

Palīgvielas:

Nātrija propil -para-hidroksibenzoāts

Nātrija metil -para-hidroksibenzoāts

Citas palīgvielas un ūdens injekcijām līdz 1ml.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Organisma detoksikācijai, pārgurušiem, novārdzinātiem dzīvniekiem, stresa mazināšanai, atveseļošanās stimulācijai pēc pārslimotām slimībām liellopiem un citi lielo sugu atgremotājiem, zirgiem, teļiem, kumelēm, aitām, jēriem, kazām, cūkām, sivēniem, trušiem, suņiem, kaķiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀ BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi un citi lielo sugu atgremotāji, zirgi, teļi, kumelji, aitas, jēri, kazas, cūkas, sivēni, truši, suņi, kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Parenterālai ievadīšanai.

Liellopiem, citiem lielajiem atgremotājiem, pieaugušiem zirgiem : 250-500ml 2 reizes dienā intravenozām, subkutānām vai intraperitoneālām injekcijām.

Teļiem, bifeļu teļiem, kumeljiem un pieaugušām aitām: 250ml 2 reizes dienā intravenozām, subkutānām vai intraperitoneālām injekcijām.

Jēriem, kazlēniem, kazām, sivēniem, cūkām: 20-40ml/10kg ķermeņa svara 2 reizes dienā intravenozām, subkutānām vai intraperitoneālām injekcijām.

Trušiem un kaķiem: 2-4ml/kg ķermeņa svara 2 reizes dienā subkutāni vairākās injekciju vietās.

Suņiem: 2-4ml/1kg ķermeņa svara 2 reizes dienā intravenozām vai subkutānām injekcijām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt istabas temperatūrā. Sargāt no gaismas un siltuma avotiem.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nav.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 250ml un 500ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija