

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0343

Metricure 500 mg suspensija ievadīšanai dzemdē liellopiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Metricure 500 mg suspensija ievadīšanai dzemdē liellopiem
Cefapirinum

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena šļirce (19 g) satur:

Aktīvā viela:

Cefapirīns (cefapirīna benzatīna veidā) 500 mg

Palīgviela(-s):

Vidēja garuma ķēžu triglicerīdi 19 g

Krēmveida eļļaina suspensija.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Subakūta un hroniska endometrīta ārstēšanai govīm (ne mazāk kā 14 dienas pēc dzemdībām), kuru ierosina pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.

Metricure var lietot atkārtoti apsēklotu govju ārstēšanai, ja ir bijušas vairāk nekā trīs neveiksmīgas apsēklošanas, un ja ir konstatēta bakteriālas infekcijas izraisīta neauglība.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem vai citām β-laktāma grupas antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos ir novērotas alerģiskās reakcijas.

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Ievadīšanai dzemdē.

Vienas Metricure šļircis saturis ir jāievada dzemdes dobumā, izmantojot pievienoto vienreizējās lietošanas katetru.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

1. Pievieno šļirci katetram.
2. Dzemdes kaklu tur ar taisnajā zarnā ievadītu roku, uz kuras uzvilks cimdus.
3. Maigām, svārstīgām kustībām, ievada katetru cauri dzemdes kaklam dzemdes dobumā.
4. Injicē Metricure.

Ja klīniskie simptomi saglabājas, var būt nepieciešama atkārtota ārstēšana pēc 7-14 dienām. Dzīvniekiem, kuri ir bijuši apsēkloti, Metricure var ievadīt vienu dienu pēc apsēklošanas. Piometras gadījumā vispirms ir ieteicama ārstēšana ar prostaglandīniem, lai ierosinātu luteolīzi un lai tiktu izvadīti izdalījumi no dzemdes dobuma.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 24 stundas.

Pienam: nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Šo veterināro zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu mikroorganismu jutības testu rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jāpamato ar reģionālo, saimniecības līmeņa epidemioloģisko situāciju par mērķa baktēriju jutību.

Zāļu lietošana, atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināt rezistentu baktēriju izplatību un samazināt ārstēšanas efektivitāti ar citiem pretmikrobu līdzekļiem, jo ir iespējama krusteniskās rezistences rašanās.

Šīs veterinārās zāles jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kuros novērojama vāja vai iespējami vāji reakcija uz ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobiem līdzekļiem vai šaura spektra β-laktāma grupas pretmikrobiem līdzekļiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas reakcijas.

Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. Ja pēc zāļu lietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības laikā. Drīkst lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot cefalosporīnus kombinācijā ar bakteriostatiskas darbības pretmikrobām zālēm, to antagonistiskās darbības dēļ.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.