

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/01/1379

Micospectone šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), Itālija.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Micospectone šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām, cūkām
Lincomycin/ Spectinomycin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur -

Aktīvās vielas:

Linkomicīna hidrohlorīds, kas atbilst 50 mg linkomicīna;

Spektinomicīna hidrohlorīds, kas atbilst 100 mg spektionmicīna.

Palīgvielas:

Benzilspirts

Ūdens injekcijām līdz 1 ml.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Elpošanas orgānu infekciju, enterīta, nagu infekciju, mastīta, klostridiozes un mikoplazmozes ārstēšanai liellopiem, aitām un kazām.

Baktēriju vai mikoplazmu izraisītas pneimonijas, septiska artrīta, bakteriāla enterīta, hemorāģiskās diarejas, *Haemophilus* spp. izraisītas pneimonijas ārstēšanai cūkām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot dzīvniekiem, kuri ārstēti ar miorelaksantiem.

Kontrindicēta lietošana citu sugu dzīvniekiem, īpaši zirgiem, trušiem un mājputniem dēšanas periodā.

6. IESPĒJAMĀ BLAKUSPARĀDĪBAS

Aitām, kazām un cūkām iespējama diareja; kazām ēstgribas zudums un piena izslaukuma samazināšanās. Grūsnām aitām pēdējo 50 grūsnības dienu laikā *Micospectone* lietošana var izraisīt abortu un letālu iznākumu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, kazas, cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Dziļām intramuskulārām injekcijām vairākās injekcijas vietās:

- liellopiem, aitām un kazām 1ml/10 kg ķermeņa svara 2- 4 reizes pēc kārtas ar 12-24 stundu intervālu;
- cūkām 1ml/ 10 kg ķermeņa svara 1 reizi dienā 3- 7 dienas pēc kārtas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

Pienam: 72 stundas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 18 dienas.

Aitas, kazas:

Gaļai un blakusproduktiem: 30 dienas.

Pienam: 108 stundas (9 slaukšanas reizes)

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt vēsā tumšā vietā temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Grūsnība: Lietot pēc ārstējošā veterinārārsta potenciālā ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Nelietot dzīvniekiem, kuru ārstēšanā lietoti miorelaksanti. Nepārsniegt norādītās devas!

Nav specifiska antidota pārdozēšanas gadījumā.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 50ml, 100ml, 250ml un 500ml. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,
Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Latvija