

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/03/1548

Nekro Veyxym suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, aitām un kazām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nekro Veyxym suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, aitām un kazām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

1'200 FIP-U himotripsīns (atbilst apmēram 4 mg)
120 FIP-U tripsīns (atbilst apmēram 4 mg)
15 FIP-U papaīns (atbilst apmēram 10 mg)

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopi, cūkas, aitas un kazas:

Sekojošu infekcijas slimību, kuras norisinās ar eksudāciju, papildu ārstēšanai – plaušu, tesmens, nagu infekcijas, artrīts, pēcdzemdību slimības, flegmona, panarcijs, aktinomikoze, papilomatoze, kā arī audzēji pirms- un pēcoperācijas stadijās.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Lokālā reakcija, ko izraisa Nekro Veyxym, izveidojas par iedarbīgu sistēmisku nespecifiskās rezistences aktivizāciju, kas izpaužas kā drudzis un vidējs iekaisums injekcijas vietā.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas, aitas un kazas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārām injekcijām.

Deva 0,4 ml / 10 kg ķermeņa svara.

Ievadīt vairākās injekcijas vietās, atkarībā no devas lieluma.
Vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā pusi no paredzētās devas.

Maksimālā deva vienā injekcijas vietā:

Liellopiem: 20 ml.

Cūkām: 10 ml.

Aitām un kazām: 3 ml.

Lietot vienu līdz divas reizes 24 stundu laikā.

Nepārsniet kopējo Nekro Veyxym devu 0,8 ml/10 kg ķermeņa svara.

Pirms lietošanas flakonu saskalināt.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā un uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Devu 0,8 ml Nekro Veyxym / 10 kg ķermeņa svara nedrīkst pārsniegt, jo var rasties nopietna muskuļu šūnu destrukcija.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai gļotādām, skarto ādu mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm, savukārt skarto gļotādu skalot ar lielu daudzumu ūdens, lai izvairītos no komplikācijām.

Grūsnība un laktācija:

Nav noteikts veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Veicina antibiotiku terapijas efektivitāti, īpaši inficētu, strutojošu, gangrenozu un pūstošu procesu gadījumos.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ja deva pārsniedz 0,8 ml Nekro Veyxym / 10 kg ķermeņa svara, tad var būt novērojamas nevēlamas reakcijas. Intramuskulāra injekcija var izsaukt no devas atkarīgas sāpes un daļēji

izteiktu lokālu iekaisumu. Gan lokāla iekaisuma reakcija, gan sāpju reakcija ir savstarpēji saistītas ar lietošanas biežumu un devu.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

02/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmērs: 1 x 50 ml flakonu un 1 x 100 ml flakonu.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.