

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/97/0510**

**Neostomosan concentrate uz ādas lietojams šķīdums zirgiem, suņiem un kaķiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Ceva Santé Animale  
10 av. de La Ballastière  
33500 Libourne  
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd  
H- 1107 Budapest, Szállás u.5.  
Ungārija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Neostomosan concentrate uz ādas lietojams šķīdums zirgiem, suņiem un kaķiem**

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1 ml šķīduma satur:

**Aktīvās vielas:**

Transmikss      50 mg  
Tetrametrīns     5 mg

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Sporta zirgi: kašķa novēršanai un ārstēšanai, kā arī mušu, utu un ērcu invāzijas ārstēšanai.

Suņi un kaķi: blusu, ērcu un utu invāzijas novēršanai un ārstēšanai; demodekozes, sarkoptozes un otodektozes ārstēšanai.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav zināmas. Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Sporta zirgi, suņi un kaķi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Ārīgai lietošanai.

Apsmidzināšanai vai vannošanai.

Zirgiem:

Mušu un citu ektoparazītu iznīcināšanai:

Apstrādāt dzīvnieka ķermeņa virsmu atšķaidot koncentrātu attiecībā 1:400 ( 1 l uz 400 l ūdens).

Atkārtota apstrāde ieteicama ar 3 dienu intervālu.

Suņiem un kaķiem:

Mazgāšanai, aplaistīšanai vai apsmidzināšanai sagatavo šķīdumu 1: 200. Blusu vai utu invāzijas gadījumā apstrādāt visu dzīvnieka ķermeņa virsmu, kā arī dzīvnieka guļvietu. Ērces aiziet bojā pāris stundu laikā. Vienreizēja dzīvnieka apstrāde nodrošina aizsardzību pret atkārtotu invadēšanos 2-3 dienas.

Sarkoptozes un demodekozes gadījumā dzīvnieka apstrādi atkārtot ar 10 dienu intervālu, līdz divos sekojošos ādas nokasījumos ērces neatrod.

Ērču izraisīta ārējā auss iekaisuma (*Otitis externa*) gadījumā sagatavoto šķīdumu ievadīt abās ausīs, cenšoties samitrināt ārējās auss kanālu. Ārstēšanu atkārtot pēc 7 dienām.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Nav.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu un gaļu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Sargāt no gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Sargāt no sasalšanas. Sargāt no karstuma un ugunsbīstamiem materiāliem. Uguns nedrošs.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma (polietilēna pudeles) atvēršanas: 6 mēneši.

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas saskaņā ar norādījumiem: 24 stundas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Tikai ārīgai lietošanai.

Sagatavotais šķīdums jāizlieto 24 stundu laikā.

Toksisks zivīm un bitēm. Nepieļaut zāļu vai to iepakojumu nokļūšanu dīķos, ūdenstilpēs vai grāvjos.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ugunsnedrošs. Izsmidzinot veterinārās zāles, jāizmanto individuāls aizsargtērps, kas sastāv no aizsargapģērba, aizsargbrillēm, ūdens necaurlaidīgiem cimdiem un sejas maskas. Izvairīties no nejaušas saskares ar ādu, nokļūšanas acīs vai ieelpošanas.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai nokļūšana acīs, skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja notikusi nejauša norīšana, saskare ar ādu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Toksikozes gadījumā var novērot siekalošanos, vemšanu, diareju, trīci/uzbudinājumu. Krampju gadījumā ieteicams lietot diazepāmu.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Toksisks zivīm un bitēm. Nepieļaut zāļu vai to iepakojumu nokļūšanu dīķos, ūdenstilpēs vai grāvjos. Sajaucot 10 g kaļķa ar 1 litru darba šķīduma, aktīvā viela sadalās 48 stundu laikā. Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

02/2022

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Kartona kaste ar 5 x 5 ml flakoniem.

Kartona kaste ar 100 x 5 ml flakoniem.

200 ml polietilēna pudele.

250 ml polietilēna pudele.

1 litra polietilēna pudele.

5 litru polietilēna pudele.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.