

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/93/0040

Nobivac Rabies suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, lapsām, mājas seskiem, suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Intervet International B.V.
Wim de Kórverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobivac Rabies suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, lapsām, mājas seskiem, suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena deva (1 ml) satur:

Aktīvā viela:

Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms Pasteur RIV..... $\geq 0,95$ AIU*, kas atbilst ≥ 2 IU**

* sērijas pārbaude veikta *in vitro* iedarbīguma testā saskaņā ar Ph. Eur. monogrāfiju 451. AIU = trakumsērgas antigēna daudzums AlphaLisa starptautiskajās vienībās.

** atbilstošais iedarbīgums *in vivo* provokācijas testā pelēm, saskaņā ar Ph. Eur. monogrāfiju 451.

Adjuvants:

Alumīnija fosfāts..... 146 mg

Palīgviela(s):

Tiomersāls..... 0,1 mg (0,01%)¹

4. INDIKĀCIJAS

Suņu, kaķu, liellopu, aitu, kazu, lapsu, mājas sesku un zirgu aktīvai imunizācijai pret trakumsērgu.

Imunitātes iestāšanās: pēc 21 dienas.

Imunitātes ilgums: suņiem un kaķiem – 3 gadi, liellopiem un zirgiem – 2 gadi, aitām, kazām, mājas seskiem un lapsām – 1 gads.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

¹ attiecas tikai uz daudzdevu flakoniem. Vienas devas flakoni nesatur konservantu.

Reti, pēc subkutānas ievadīšanas var novērot pārejošu, iztaustāmu mezgliņu injekcijas vietā. Retos gadījumos pēc ievadīšanas var novērot vispārīgas pastiprinātas jutības reakcijas. Šādā gadījumā var tikt indicēta subkutāna adrenalīna ievadīšana.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai arī uzskatāt, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, liellopi, aitas, kazas, lapsas, mājas seski un zirgi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

1 ml vakcīnas intramuskulārai vai subkutānai injekcijai.

	Suņi/kaķi	Liellopi/zirgi	Aitas/kazas	Seski/lapsas
Primārā vakcinācija vecumā vai vecākiem	12 nedēļas 3 mēneši*	6 mēneši*	6 mēneši*	12 nedēļas 3 mēneši*
Revakcinē ik pēc	3 gadiem**	2 gadiem**	1 gada**	1 gada**
Ievadīšanas veids	i.m. vai s.c.	i.m.	i.m.	s.c.

*Primārā vakcinācija var tikt veikta agrīnākā vecumā, bet tad vakcināciju atkārtoti 12 nedēļu vai 6 mēnešu vecumā, atkarībā no sugas.

** Spēkā esošie vietējie noteikumi var noteikt pieprasīt ātrāku revakcināciju.

Seroloģisko pētījumu rezultāti parāda, ka aitu, kazu un lapsu vakcinācija nodrošina aizsardzību ne mazāk kā vienu gadu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 °C).

Izmantot sterilas šļirces un adatas.

Pirms lietošanas un lietošanas laikā labi saskalināt.

Suņiem:

Nobivac Rabies var tikt lietots, lai izšķīdinātu liofilizētās Nobivac vakcīnas: Nobivac DHPPi, Nobivac DHP, Nobivac Puppy DP un kombinācijā ar Nobivac Lepto.

Kaķiem:

Nobivac Rabies var tikt lietots, lai izšķīdinātu liofilizēto Nobivac Tricat vakcīnu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nesasadēt.

Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš 10 devu flakonam pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 24 stundas.
Derīguma termiņš 1 devas flakonam pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc "EXP".

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību, un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad tā tiek lietota kopā ar citām, izņemot iepriekš minētajām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pēc divkārtas devas ievadīšanas, netika novērotas citas blakusparādības, kā tikai tās, kas minētas 6. punktā.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citu vakcīnu vai imunoloģiskajām zālēm, izņemot 9. punktā minētās.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2021

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.