

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/98/0806

Norocillin 300 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, aitām, cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry
Co. Down, BT35 6JP
Lielbritānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Norocillin 300 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem, aitām, cūkām
Procaine benzylpenicillin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

Prokaīna benzilpenicilīns 300 mg/ml

Palīgviela(s):

Metilhidroksibenzoāts 1,12 mg/ml

Etilhidroksibenzoāts 0,23 mg/ml

Propilhidroksibenzoāts 0,16 mg/ml

Sterils, balts šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem, aitām, cūkām pret penicilīnu jutīgu ierosinātāju izraisītu sekojošu sistēmisku infekcijas slimību ārstēšanai: sarkanguļa; nabas un locītavu infekcijas; elpceļu infekcijas, t.sk. pneimonija, atrofiskais rinīts; listerioze; septicēmija; uroģenitālo orgānu infekcijas; sekundāra bakteriālā infekcija vīrusu izraisītu slimību gadījumā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Neievadīt intravenozi vai intratraheāli.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīnu vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot mazajiem grauzējiem, tādiem kā jūdescūciņas, smilšu peles un kāmji.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Zīdējsivēniem un nobarojamām cūkām zāļu lietošana var izraisīt pārejošu drudzi, vemšanu, trīcēšanu, apātiju un kustību koordinācijas traucējumus.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Dziļām intramuskulārām injekcijām.

Ieteicamā deva: 10 mg / kg ķermeņa svara (1ml/30 kg) vienu reizi dienā 3 - 5 dienas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Saskalināt flakonu pirms lietošanas.

Nepārsniegt noteiktās devas. Lai nodrošinātu atbilstošu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu pārāk mazas devas ievadīšanu.

Ievērot vispārpieņemtus aseptikas pasākumus.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 84 stundas.

Aitas:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Nelietot aیتām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Sargāt no gaismas. Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C).

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Kad vien iespējams, šīs zāles vajadzētu lietot, pamatojoties uz baktēriju jutības testu rezultātiem. Veicot injekciju, jāievēro vispārpieņemtie aseptikas pasākumi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, inhalācijas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisku reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas.

1. Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.
3. Ja pēc zāļu pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir daudz nopietnāki simptomi, tādēļ nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā. Tomēr grūsnām sivēnmātēm un jauncūkām iespējami izdalījumi no vulvas, kas ir saistīti ar abortu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Penicilīniem ir pierādīta plaša drošuma robeža.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

In vitro testi uzrādīja jutību sekojošiem ierosinātājiem: *Corynebacterium pyogenes*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Listeria*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, penicilināzi neproducējošie stafilokoki un *Streptococcus* spp.

Flakons pa 50 ml un 100 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.