

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/DCP/17/0034**  
**Ophtaclin vet 10 mg/g acu ziede suņiem, kaķiem un zirgiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Le Vet. Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater,  
Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonksveer  
Nīderlande

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Ophtaclin vet 10 mg/g acu ziede suņiem, kaķiem un zirgiem.**  
*Chlortetracycline hydrochloride*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Katrs grams satur:

**Aktīvās vielas:**

Hlortetraciklīna hidrohlorīds 10,0 mg  
(atbilst 9,3 mg hlortetraciklīna)

Iedzeltena vai dzeltena viendabīga ziede

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Kerāfīta, konjunktivīta un blefarīta ārstēšanai, ko izraisījušas *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*,  
*Proteus spp.* un/vai *Pseudomonas spp.*

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, pret citiem tetraciklīniem vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Atsevišķos gadījumos spontānajos ziņojumos pēc veterināro zāļu lietošanas ļoti reti ziņots par reakcijām uzklāšanas vietā un acu bojājumiem, piemēram, kairinājumu, niezi, tūsku un apsārtumu.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā, kas atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv).

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi un zirgi.



## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Tikai okulārai lietošanai.

Zirgiem: ieklāt 2-3 cm ziedes (atkarībā no dzīvnieka lieluma) konjunktīvas maisīnā 4 reizes dienā 5 dienas. Ja pēc 3 dienu ārstēšanas klīniska uzlabošanās nav novērojama, jāapsver alternatīvas terapijas uzsākšana.

Suņiem un kaķiem: ieklāt 0,5-2 cm ziedes (atkarībā no dzīvnieka lieluma) konjunktīvas maisīnā 4 reizes dienā 5 dienas. Ja pēc 3 dienu ārstēšanas klīniska uzlabošanās nav novērojama, jāapsver alternatīvas terapijas uzsākšana.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

Nav reģistrēts lietošanai ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Derīguma termiņš pēc pirmās tūbiņas atvēršanas: 14 dienas

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc "EXP".

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

### Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Veterināro zāļu lietošana jāpamato ar mērķa patogēna(-u) noteikšanu un jutības testēšanu. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jāpamato ar vietēja rakstura (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko informāciju par mērķa patogēnu jutību.

Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Veterināro zāļu lietošana, neievērojot zāļu aprakstā sniegtos norādījumus, var palielināt pret hlortetraciklīnu rezistentu baktēriju pārsvaru un iespējamās krusteniskās rezistences dēļ samazināt ārstēšanas efektivitāti, lietojot citus tetraciklīnus.

### Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Šīs veterinārās zāles var izraisīt ādas sensibilizāciju, pastiprinātas jutības reakcijas un/vai acu kairinājumu.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret tetraciklīniem jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Izvairīties no saskares ar ādu un acīm.

Rīkojoties ar šīm zālēm, izmantot necaurlaidīgus cimdus.

Ja notikusi saskare ar ādu, nomazgāt skarto ādas laukumu ar ūdeni un ziepēm. Ja Jums pēc saskares ar ādu rodas tādi simptomi, kā, piemēram, izsitumi uz ādas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Ja notikusi saskare ar acīm, nekavējoties nomazgāt ar tīru ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

### Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejami dati.

### Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Nav pieejami dati.

## 13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

## 14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2022

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Ar epoksīdsveķiem lakota alumīnija tūbiņa, kas satur 5 g, ar ABPE kanulu un uzskrūvējamu vāciņu.  
Viena tūbiņa kartona kārbā.

Recepšu veterinārās zāles.