

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/02/1490**

**Otopet Therapy ausu pilieni, suspensija suņiem un kaķiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A.  
Via Emilia, 285  
Ozzano Emilia (BO)  
Itālija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Otopet Therapy** ausu pilieni, suspensija suņiem un kaķiem.

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1 ml satur:

**Aktīvās vielas:**

Rifaksimīns	10 mg
Kolistīna sulfāts	200 000 IU
Mikonazols	17,4 mg
Karbarils	10 mg
Triamcinolona acetonīds	1 mg
(atbilst 0,908 mg triamcinolona)	

**Palīgvielas:** līdz 1 ml

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Suņiem un kaķiem ārējās auss iekaisuma ārstēšanai, ko ierosina pret rifaksimīnu un kolistīna sulfātu jutīgas grampozitīvās un gramnegatīvās baktērijas (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Proteus* spp., *Pseudomonas aeruginosa* un *Escherichia coli*), mikroskopiskās sēnes (*Malassezia pachydermatis*, *Candida* spp.), ausu kašķa ērcītes (*Otodectes cynotis*).

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot gadījumos, ja ausī konstatēta bungādiņas perforācija.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Suņi, kaķi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Lokālai lietošanai auss kanālā.

Pirms lietošanas flakona saturu saskalināt.

Pēc auss kanāla tīrīšanas, aplicē 1-2 ml Otopet Therapy suspensiju un masē auss pamatni, līdz zāles ir izplatījušās pa visu auss kanāla sienu.

Procedūru atkārto 2 reizes dienā 7-10 dienas pēc kārtas.

Ektoparazītu izraisīta otīta gadījumā, terapiju atkārto pēc 10 dienām.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizmanto aizsargcimdi, lai novērstu saskari ar karbarilu, kurš var būt toksisks absorbējoties caur ādu. Zāles var iekrāsot audus uz kuriem tās nokļūst.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Sargāt no gaismas. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Šīs veterinārās zāles nav paredzētas lietošanai produktīviem dzīvniekiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem, kā arī jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Pirms šo veterināro zāļu lietošanas rūpīgi jāizmeklē ārējais dzirdes kanāls, lai pārliecinātos, ka bungādiņa nav perforēta un nepastāv infekcijas pārnesšanas risks uz vidusausi, kā arī lai netiktu pieļauts auss gliemeža un vestibulārā aparāta bojājums.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizmanto aizsargcimdi, lai novērstu saskari ar karbarilu, kas var būt toksisks, absorbējoties caur ādu.

Suspensija var iekrāsot audus, uz kuriem tā nokļūst.

Izvairīties no šo zāļu saskares ar ādu, gļotādām un iekļūšanas acīs. Gadījumā, ja šīs zāles nokļuvušas uz ādas vai gļotādām, nekavējoties skalot tās ar lielu ūdens daudzumu un novilkt kontaminēto apģērbu, kas ir tiešā saskarē ar ādu. Ja šīs zāles iekļuvušas acīs, skalot tās ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas acu kairinājums, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība, laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

10/2017

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 25 ml

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Optim Vet"  
Mētru iela 6,  
Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430  
Latvija