

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0445

Pen & Strep suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām un cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry
Co. Down, BT35 6JP
Lielbritānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Pen & Strep suspensija injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām un cūkām
Procaini benzylpenicillinum /Dihydrostreptomycini sulfas

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Prokaīna penicilīns | 200 mg/ml |
| Dihidrostreptomicīna sulfāts | 250 mg/ml |

Balta līdz bāla ūdens suspensija.

4. INDIKĀCIJAS

Liellopiem, zirgiem, aitām un cūkām sistēmisku infekciju ārstēšanai, kuras ierosina pret penicilīnu un streptomicīnu jutīgi mikroorganismi, ieskaitot:

Arcanobacterium(Truoperella) pyogenes
Erysipelothrix rhusiopathiae
Klebsiella pneumoniae
Listeria spp.
Manheimia haemolytica

Pasteurella multocida
Staphylococcus spp. (penicilināzi neproducējošie)
Streptococcus spp.
Salmonella spp.

Jūtīgu mikroorganismu izraisītas sekundāras bakteriālas infekcijas ārstēšanai, kuras primārais cēlonis ir vīrusu infekcija.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Zīdējsivēniem un nobarojamām cūkām šo zāļu ievadīšana reizēm var izraisīt īslaicīgu drudzi, vemšanu, trīcēšanu, apātiju un kustību koordinācijas traucējumus.

Zirgiem intramuskulāras injekcijas vietā var novērot pārejošu lokālu pietūkumu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, aitas, cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Pirms lietošanas saskalināt.

Lietot dziļām intramuskulārām injekcijām.

Ieteicamā dienas deva: 8 mg prokaīna penicilīna un 10 mg dihidrostreptomicīna sulfāta uz 1 kg ķermeņa svara, kuru iegūst ievadot 1 ml Pen & Strep uz 25 kg ķermeņa svara.

Devu ievadīt intramuskulāri vienu reizi dienā, līdz trim dienām pēc kārtas.

Maksimālā deva vienā injekcijas vietā nedrīkst pārsniegt 15 ml zirgiem, 6 ml liellopiem, 3 ml aitām un 1,5 ml cūkām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nepārsniegt ieteicamo devu vai ārstēšanas kursa ilgumu.

Aminoglikozīdiem ir šaurāks drošības sliekšnis nekā beta-laktāma grupas antibiotikām.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem: pienam: 60 stundas.

Nelietot aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Gaļai un blakusproduktiem: liellopiem: 23 dienas, cūkām: 18 dienas, aitām: 31 diena.

Nelietot zirgiem, kuru gaļu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C). Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Neizlietotās veterinārās zāles iznīcināt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Lietot uzmanīgi dzīvniekiem, kuriem ir nieru slimības vai nepietiekamas nieru funkcijas.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Kad vien iespējams, šīs zāles ieteicams lietot, pamatojoties uz baktēriju jutības testu rezultātiem. Rūpēties, lai netiktu pārsniegta ieteicamā deva, jo aminoglikozīdiem ir augstāka toksicitāte par beta-laktāma grupas antibiotikām.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātu jutību (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisku reakciju pret cefalosporīniem, un otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas uz šīm vielām var būt nopietnas.

1. Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

3. Ja pēc lietošanas novērojami tādi simptomi, ka ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību, un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Grūsnība un laktācija:

Pen & Strep var lietot dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā. Ir ziņots, ka grūsnām sivēnmātēm un jauncūkām novēroti izdalījumi no vulvas, kas varētu būt saistīti ar iespējamu abortu.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot kopā ar citām antibiotikām, tādām kā tetraciklīni, vai ar citiem aminoglikozīdiem.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA PĀRSKATĪTA

05/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Stikla flakons pa 50 ml un 100 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.