

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/96/0296

Perlutex 5 mg tabletes suņiem un kaķiem

## 1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Dānija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster

Vācija

## 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Perlutex 5 mg tabletes suņiem un kaķiem

## 3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena tablete satur:

**Aktīvā viela:**

Medroksiproģesterona acetāts 5 mg

**Palīgvielas:**

Laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, talks, želatīns, magnija stearāts.

## 4. INDIKĀCIJAS

Ilgstošai meklēšanās (*estrus*) aizkavēšanai kaķiem.

Īslaicīgai meklēšanās (*estrus*) pārtraukšanai suņiem.

## 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Perlutex tabletes nedrīkst lietot:

- Dzimumbriedumu nerasniegušiem dzīvniekiem.
- Grūsnības laikā vai, ja iespējams, ir iestājusies grūsnība.
- Reproduktīvās sistēmas patoloģiju gadījumā vai, ja slimības vēsturē ir dzimumcikla patoloģija, vai ja ir nosliece uz piometrai līdzīgu stāvokli.
- Laktējošām kaķenēm.
- Suņiem un kaķiem ar aknu vai aizkuņģa dziedzera slimībām.
- Suņiem un kaķiem ar *diabetes mellitus* un/vai akromegāliju.
- Ilgstošai ārstēšanai dzīvniekiem pirms vai pēc meklēšanās vai meklēšanās laikā, jo tas var palielināt cistoza endometrija hiperplāzijas risku, it īpaši vecākiem dzīvniekiem.
- Dzīvniekiem, kuriem konstatēts audzējs.

## 6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc ilgstošas MPA (medroksiprogesterona acetāta) lietošanas var attīstīties virsnieru garozas, aizkuņģa dziedzera un aknu patoloģijas.

Pēc lietošanas pirms meklēšanas vai meklēšanas laikā var novērot endometrija izmaiņas.

Ārstēšanas sākumā īslaicīgi var tikt novērotas šādas blakusparādības:

- Palielināta ēstgriba un svara pieaugums. Ja nepieciešams, ir jāregulē barības uzņemšana.
- Uzvedības izmaiņas.
- Piena dziedzera palielināšanās.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Īslaicīgai meklēšanas pārtraukšanai kucēm:

2 tabletes 3-4 dienas, pēc tam 1 tablete 12-14 dienas. Devu dubulto kucēm ar ķermeņa svaru vairāk par 15 kg.

Ilgstošai meklēšanas aizkavēšanai kaķenēm:

1 tablete nedēļā.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Dažām kaķenēm var būt grūti noteikt anestrus un diestrus, un tas var tikt kļūdaini sajaukts ar agrīnu grūsnību. Tāpēc var būt nepieciešams izolēt kaķeni vienu meklēšanas periodu, lai pārlicinātos, ka lietošana tiek uzsākta diestrus laikā.

Ja meklēšanas kucei ir bijusi pārtraukta, lietojot Perlutex tabletes, tad nākamā meklēšanas parasti sākas nedaudz ātrāk, kā sagaidāms. Kaķenēm pēc Perlutex tablešu lietošanas pārtraukšanas, meklēšanas var sākties ar dažādu intervālu.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Pēc ilgstošas Perlutex lietošanas, to uzņemšana uz laiku ir jāpārtrauc, lai novērstu virsnieru garozas, piena dziedzeru, aizkuņģa dziedzera un aknu patoloģijas, kas var attīstīties pēc nepārtrauktas MPA (medroksiprogesterona acetāta) lietošanas.

Izvairīties no pēkšņas šo veterināro zāļu lietošanas pārtraukšanas. Ja veterināro zāļu lietošana pārtraukta pēkšņi, dzīvnieks ir rūpīgi jānovēro, jo iespējama glikozes nepanesamība un virsnieru nepietiekamība. Vecākus dzīvniekus ir ieteicams novērot vai neparādās glikozūrija, kas saistīta ar *diabetes mellitus* un/vai akromegāliju.

Pēc meklēšanās pārtraukšanas var novērot izmaiņas endometrijā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:  
Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības un laktācijas laikā.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

01/2022

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

20 tabletes un 60 tabletes blistera iepakojumos, kas ievietoti kartona kastītē. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

A/S Dimedium Latvija

+371 67610001

[info@dimedium.lv](mailto:info@dimedium.lv)