

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/01/1335

Pestorin mormyx inj. sicc. ad us. vet. liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām
pagatavošanai trušiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

Biovaeta, a.s., Ivanovice na Hane, Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Čehijas
Republika.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Pestorin mormyx inj. sicc. ad us. vet. liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām
pagatavošanai trušiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viena deva (1ml) satur -

1) Šķidrās komponents:

Vielas nosaukums	Daudzums	Funkcija
Trušu hemorāģiskās slimības vīruss – inaktivēts	min. 128 HA max. 1024 HA	Aktīvā viela
Algedrāts	0.2 ml	Adjuvants
Tiomersāls	0.085-0.115 mg	Konservants
Nātrija hlorīds	līdz 1ml	Šķīdinātājs

2) Liofilizētais komponents:

Vielas nosaukums	Daudzums	Funkcija
Miksomatozes vīruss – novājināts	min. $10^{3.3}$ TCID ₅₀ max. $10^{5.8}$ TCID ₅₀	Aktīvā viela
Liofilizējošā vide	līdz 1ml	Aizsargviela
Barotne MEM		Barotne

4. INDIKĀCIJA(-S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret trušu hemorāģisko slimību un
miksomatozi.

Ieteicama sekojoša imunizācijas shēma:

Truši jāvakcinē 10 nedēļu vecumā.

Nelabvēlīgu infekciozu apstākļu gadījumā vakcināciju var uzsākt agrāk:

a) vakcināciju ar monovalentu vakcīnu pret miksomatozi (Myxoren) var uzsākt 4 nedēļu
vecumā un turpināt revakcināciju ar vakcīnu Pestorin mormyx inj. sicc. ad us. vet. , ko ievada
ne agrāk kā 10 nedēļu vecumā. Starp vakcīnu Myxoren un Pestorin mormyx inj. sicc. ad us.
vet. ievadīšanu jāievēro 2 nedēļu intervālu.

b) Vakcināciju ar vakcīnu Pestorin Mormyx inj. sicc. ad us. vet. var uzsākt 6 nedēļu vecumā

un pēc 4 nedēļām ievadīt otro devu.

Vaislas dzīvniekus turpmāk revakcinē ar Pestorin mormyx inj. sicc. ad us. vet. ik pēc 6 mēnešiem.

Nemot vērā slimības sezonālo raksturu, dzīvnieki jāvakcinē (jārevakcinē) savlaicīgi, lai nodrošinātu to pilnu imunitāti infekcijas uzliesmojuma kritiskajā periodā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nevakcinēt slimus un novājinātus dzīvniekus. Nevakcinēt trušu mātes pēdējā grūsnības nedēļā, jo skarba apiešanās var izraisīt spontāno abortu.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja rodas būtiskas blakusparādības vai cita iedarbība, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informēties par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Truši

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Deva: 1ml, neatkarīgi no dzīvnieka lieluma.

Ievadīšanas veids – subkutāni.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas šķidro vakcīnu saskalināt un izmantot liofilizētās vakcīnas šķīdināšanai. Izšķīdināto vakcīnu maisījumu izlietot 2 stundu laikā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS (-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas (jo iespējama lokāla audu reakcija, kura izzūd 7 dienu laikā).

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nav.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2011

15. CITA INFORMĀCIJA

Tikai praktizējošam veterinārārstam.

Imunoloģiskās īpašības

Vakcīnā esošie antigēni pēc ievadīšanas dzīvnieka organismā ierosina specifisko antivielu veidošanos, kas aizsargā imunizēto dzīvnieku pret trušu hemorāģisko slimību un miksomatozi.

Imunitāte pret miksomatozi izveidojas 9 dienās; pret hemorāģisko slimību – 10 dienu laikā. Imunitāte pret miksomatozi ilgst 1 gadu; pret hemorāģisko slimību – 6 mēnešus.

Iepakojumi: 1 x 1 deva, 5 x 1 deva, 10 x 1 deva
1 x 5 devas, 5 x 5 devas, 10 x 5 devas
1 x 10 devas, 5 x 10 devas, 10 x 10 devas
1 x 20 devas, 5 x 20 devas, 10 x 20 devas

Lietošanai dzīvniekiem.