

Pronefra

Lietošanai dzīvniekiem.

Pronefra™ ir garšīga papildbarība suspensijas veidā iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem, nieru darbības atbalstam, hroniskas nieru slimības gadījumos. Palīdz samazināt uzņemtā fosfora daudzumu, saglabāt normālu nieru struktūru un regulēt asinsspiedienu.

Pronefra™ ir garšīga suspensija iekšķīgai lietošanai ar 4 svarīgām sastāvdaļām:

- kalcija karbonāts un magnija karbonāts samazina fosfora diētisko pieejamību gremošanas traktā;
- hitozāns piesaista urēmiskos toksīnus zarnās;
- oligopeptīdi no zivju proteīna sekmē asinsspiediena līdzsvara uzturēšanu.

Patīkamā garša padara produktu vieglāk uzņemamu dzīvniekam, salīdzinot ar kapsulām vai tabletēm.



SASTĀVS. Rafinēta augu (olīvu, kokosriekstu) eļļa, dzīvnieku gaļa un mājputnu izcelsmes blakusprodukti, kalcija karbonāts 3,6%, hidrolizēts zivju proteīns 1,9%, hitozāns 1%, magnija karbonāts 1%.

Tehnoloģiskas piedevas 1kg: 1c emulgators : polioksietilēn-20-sorbitān-monooleāts E433: 4900 mg.

Analitiskie komponenti: kopējās un tauki 79.9%, kopproteīns 7.6%, kopšķiedra 0.33%, koppelni 4.7%.

LIETOŠANA. Ieteicamā deva jāaprēķina atbilstoši suņa vai kaķa ķermeņa svaram. Lai deva būtu pēc iespējas precīzāka, dozēšanai izmantot komplektā esošo dozēšanas šļirci un adaptera vāciņu. Dot 2x dienā kopā ar barību vai tieši pirms vai tūlīt pēc barošanas, perorāli ar dozēšanas šļirci (kaķim 1 ml uz 4 kg ķermeņa svara, sunim 1 ml uz 5 kg ķermeņa svara), sākotnēji līdz 6 mēnešiem. Nepārsniegt ieteicamo devu. Pirms lietošanas vai lietošanas perioda pagarināšanas, ieteicams konsultēties ar veterinārārstu. Vienmēr nodrošiniet dzīvniekam pieejamu svaigu dzeramo ūdeni. Produkts var būt nepiemērots lietošanai atsevišķiem vecākiem dzīvniekiem, vai dzīvniekiem, kam veic ārstēšanu, un kam ir gremošanas traucējumi / jutīga gremošanas sistēma. Ja produkts tiek atņemts, ir ieteicams produkta devu dažas dienas samazināt, un ja traucējumi saglabājas, konsultēties ar veterinārārstu.

KĀ PAREIZI LIETOT PRONEFRA DOZATORU? (skatīties piktogrammas iepakojumam pievienotajā lietošanas pamācībā)

- 1: Pirms lietošanas pudeli rūpīgi saskalināt.
- 2: Atskrūvējiet balto vāciņu, lai atvērtu pudeli.
- 3&4: Uzskrūvējiet zilo adaptera vāciņu uz pudeles.
- 4: Turiet pudeli vertikāli un atveriet adaptera mazo vāciņu.
- 5: Stingri ievietojiet dozēšanas šļirci adaptera iekšpusē.
- 6: Apgrieziet pudeli otrādi un lēnām velciet virzuli uz leju, lai dozēšanas šļirce piepildās ar produktu. Ievilk ieteicamo daudzumu, atkarībā no dzīvnieka svara.
- 7: Apgrieziet pudeli atkal vertikāli un izņem dozēšanas šļirci, uzmanīgi to izskrūvējot no adaptera vāciņa. Aizveriet adaptera vāciņu.
- 8: Uzmanīgi pievienot produktu barībai un sajaukt, vai arī 8ba: ievietojiet šļirci mutē dzīvniekam un uzmanīgi izspiediet produktu no šļirces. Pārļiecinieties, ka dzīvnieks norij produktu.
- 9: Vienmēr turiet pudeli noslēgtu ar adaptera vāciņu. Pēc lietošanas rūpīgi izskalojiet šļirci ar tīru ūdeni. Produkts nav jāuzglabā ledusskapī.

UZGLABĀT sausā, bērniem un dzīvniekiem neredzamā un nepieejamā vietā, istabas temperatūrā. Pēc pirmreizējas atvēršanas 60 ml flakonu izlietot 2 mēnešu laikā, 180 ml flakonu - 6 mēnešu laikā. Zemā temperatūrā produkts var kļūt biezs/sastingt., bet atjaunot sākotnējo konsistenci pēc atrašanās dažas stundas istabas temperatūrā. Tas neietekmē produkta kvalitāti. Nelielu nogulšņu veidošanās ir normāla parādība.

Iepakojumums. 60 vai 180 ML flakons ar mēršļirci un adapteri.

RAŽOŠANAS SĒRIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ – norādīts uz iepakojuma.

ATBILDĪGAIS PAR MARĶĒJUMU: Virbac, Francija, aFR06033044.

RAŽOTĀJS. Pēc VIRBAC, pasūtījuma Francijā (raž. atz. Nr. aFR 36035002)

IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, reģ. Nr. LV 019020