

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/07/1702
Rilexine 200 suspensija ievadīšanai tesmenī govīm

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Virbac
1^{ère} avenue, 2065 m, LID
06516 Carros
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Haupt Pharma Latina
S.S.156 dei Monti Lepini - Km. 47,600
04100 Borgo San Michele - Latina
Itālija

Virbac
1^{ère} avenue, 2065 m, LID
06516 Carros
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Rilexine 200 suspensija ievadīšanai tesmenī govīm
Cephalexinum

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 injektors (9,4 g suspensijas) satur:

Aktīvā viela:

Cefaleksīns (monohidrāta formā) 200 mg

Palīgvielas:

Hidrogenēta rīcineļļa, butilhidroksianizols, zemesriekstu eļļa.

4. INDIKĀCIJA(AS)

Pret cefaleksīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta mastīta ārstēšanai govīm laktācijas periodā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Pastiprināta jutība pret cefalosporīniem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.
Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā www.pvd.gov.lv.

7. MĒRĶA SUGAS

Laktējošas govīs.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Ievadīšanai tesmenī.

Katrā slimajā tesmens ceturksnī ievadīt viena injektorā saturu 4 reizes ar 12 stundu intervālu. Pēc slaukšanas rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupa galu. Ievadīt injektorā kanulu pupa kanālā; ar nepārtrauktu vienmērīgu virzuļa spiedienu ievadīt visu injektorā saturu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Sk. 8. punktu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Pienam: 2 dienas (4 slaukšanas reizes).

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai::

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret cefaleksīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Grūsnība un laktācija:

Nav noteikti īpaši piesardzības pasākumi.

Šīs veterinārās zāles paredzētas lietošanai govīm laktācijas periodā.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

08/2022

15. CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

OŪ Zoovetvaru

Uusaru 5, Saue 76505

Igaunija

Tālr.: +3726709006

E-pasta adrese: zoovet@zoovet.ee