

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/08/1597**  
**Soligental 3000 IU/ml acu pilieni, šķīdums suņiem un kaķiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Virbac S.A.  
Ière Avenue 2065 M L.I.D.  
06516 Carros  
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A.  
Ière Avenue 2065 M L.I.D.  
06516 Carros  
Francija

Labiana Life Sciences S.A  
C/Venus 26  
Pol.Ind.Can Parellada  
Terrsassa 08228, Barcelona  
Spānija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Soligental** 3000 IU/ml acu pilieni, šķīdums kaķiem un suņiem  
*Gentamicinum*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1 ml šķīduma satur:

**Aktīvā viela:**

Gentamicīns (sulfāta veidā)      3000 IU

**Palīgvielas:**

Dinātrija edetāts                      5 mg  
Parahidroksibenzoskābe              0,90 mg  
Palīgvielas                              līdz 1 ml

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Pret gentamicīnu jutīgu mikroorganismu izraisīta konjunktivīta un keratokonjunktivīta ārstēšanai suņiem un kaķiem.

## **5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret gentamicīnu vai citiem aminoglikozīdiem vai pret kādu no palīgvielām.

## **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Retos gadījumos ārstēšanas sākumā var novērot konjunktīvas iekaisuma reakcijas. Šīs reakcijas ir viegli izteiktas un pārejošas, un tās izzūd spontāni, bez ārstēšanas.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Suņi un kaķi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Okulārai lietošanai.

Deva: 900 IU gentamicīna/dienā, t.i., pilina pa diviem pilieniem katrā acī trīs reizes dienā 8 dienas pēc kārtas.

Šķīdums jāpilina apakšējā plakstiņa konjunktīvas maisiņā, izmantojot dozēšanai paredzēto pipeti.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Sk. 8. punktu "Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes".

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 15 dienas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lai izvairītos no šķīduma kontaminācijas, pēc zāļu lietošanas aizvērt iepakojumu.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret aminoglikozīdiem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas.

Grūsnība un laktācija:

Soligental drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Gentamicīns šķērso placentāro barjeru un, to lietojot lielās devās, tas var izraisīt toksisku ietekmi uz augli. Soligental ir šķīdums pilināšanai acīs līdz ar to sistēmiska gentamicīna uzsūkšanās varētu būt minimāla.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšanas gadījumā var būt aizkavēta radzenes epitēlija reģenerācija.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

06/2017

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.