

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/02/1429

**T61 šķīdums injekcijām suņiem, kaķiem, lielajiem dzīvniekiem, putniem un dekoratīviem
sīkdzīvniekiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Intervet International B.V.
Wim de Kórverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International GmbH
Feldstrasse 1a
D-85716 Unterschleissheim
Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**T61 šķīdums injekcijām suņiem, kaķiem, lielajiem dzīvniekiem, putniem un dekoratīviem
sīkdzīvniekiem**

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Embutramīds	200,00 mg
Mebezonija jodīds	50,00 mg
Tetrakaīna hidrohlorīds	5,00 mg

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Dzīvnieku eitanāzijai.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot pie samaņas esošiem dzīvniekiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos ir ziņots par konvulsijām vai dzīvnieka uzbudinājumu.
Var būt aizkavēta sirdsdarbības apstāšanās.

Lietojot T61, histopatoloģiskajos izmeklējumos novēro endoteliālus bojājumus, pulmonālo asinsvadu obstrukciju, plaušu tūsku un hemolīzi.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi, lielie dzīvnieki, putni un dekoratīvie sīkdzīvnieki.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intravenozām, intrakardiālām vai intrapulmonālām injekcijām tikai bezsamaņā (narkozē) esošiem dzīvniekiem.

Lietot intravenozi. Izmantot citu šo veterināro zāļu ievadīšanas veidu drīkst tikai tad, ja intravenoza ievadīšana nav iespējama.

Tikai tad, ja nav iespējams izmantot citu ievadīšanas veidu (piem., kardiovaskulārās sistēmas kolapss), var veikt intrapulmonālu injekciju. Neatkarīgi no ievadīšanas veida, veterinārās zāles ievadīt tikai pilnībā anestezētiem dzīvniekiem, kas nereaģē uz sāpīgiem stimuliem. Nelietot šīs veterinārās zāles dzīvniekiem, kas ir pie samaņas vai kas saņēmuši tikai sedāciju vai vieglu anestēziju, un spēj just sāpes.

Suņiem:

Intravenozi	0,3-0,5 ml/kg ķermeņa svara.
Intrapulmonāli	0,7-1,0 ml/kg suņiem ar ķermeņa svaru līdz 10 kg. 13,0-20,00 ml suņiem ar ķermeņa svaru virs 10 kg.
Intrakardiāli:	0,3 ml/kg ķermeņa svara.

Kaķiem:

Intrapulmonāli	1,0 ml kaķēniem dažu dienu vecumā. 3,0 ml kaķiem līdz 6 mēnešu vecumam. 5,0 ml kaķiem vecākiem par 6 mēnešiem. 10,0 ml kaķiem smagākiem par 5 kg.
----------------	--

Putniem un dekoratīviem sīkdzīvniekiem:

Intrapulmonāli	0,5-2,0 ml atkarībā no ķermeņa svara.
----------------	---------------------------------------

Lielajiem dzīvniekiem:

Intravenozi	4,0-6,0 ml/50 kg ķermeņa svara.
-------------	---------------------------------

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt sadaļu “Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes”.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūto produkciju paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Dzīvnieki, kuri ir eitanizēti ar T61, ir iekļaujami bīstamo materiālu grupā. Jāveic piemēroti pasākumi, lai zāles saņēmēšo dzīvnieku liemeņi un blakusprodukti nenonāktu barības ķēdē un netiktu izmantoti cilvēka vai dzīvnieku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles drīkst ievadīt tikai praktizējošs veterinārārsts.
T61 drīkst lietot tikai bezsamaņā (narkozē) esošiem dzīvniekiem, lai izvairītos no pie samaņas esoša dzīvnieka nosmakšanas.
T61 lietošanas laikā nepieciešama īpaša piesardzība.
Intravenozas injekcijas laikā jānodrošina pareiza, intravaskulāra pilnas devas ievadīšana.
Ieteicams lietot venozo katetru.
Dzīvniekiem ar sirds mazspēju vai asinsrites traucējumiem šo veterināro zāļu iedarbība var būt aizkavēta un vājāka nekā gaidīts, ņemot vērā lēnāku T61 pārnesi uz mērķaudiem.
Pastāv nesekmīgu injekciju vai pašinjicēšanas risks, ja dzīvnieks pretojas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Šīs zāles ir letālas cilvēkiem. Tās nedrīkst izsniegt, piem., dzīvnieka īpašniekam vai personai, kura rūpējas par dzīvnieku.
Izvairīties no tiešas saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
Rīkojoties ar šīm zālēm, ieteicams lietot cimdus.
Nekavējoties novilkt aptraipīto apģērbu.
Ja zāles nonākušas tiešā saskarē ar atvērtu brūci vai gļotādu, nekavējoties skalot skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
Ja notikusi nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties vairākas minūtes skalot acis ar tīru ūdeni.
Ja notikusi nejauša norīšana vai pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Nekavējoties skalot brūci ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm, un saspiest injekcijas vietu.

Norādījumi veselības aprūpes speciālistam:

Embutramīda, mebezoniya jodīda un tetrakaīna hidrochlorīda koncentrācija šajās veterinārajās zālēs ir tik augsta, ka neliela daudzuma nejauša injicēšana vai norīšana var izraisīt nopietnas sekas un ir potenciāli letālas cilvēkiem. Jāveic neatliekamās palīdzības pasākumi elpošanas un sirdsdarbības uzturēšanai, tostarp kardiopulmonārā reanimācija, un, ja nepieciešams, jāveic hemodialīze, kā arī atbalsta terapija (atropīns, neostigmīns, N-acetilcisteīns) atkarībā no iedarbības lieluma un simptomiem.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsniem dzīvniekiem.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

12/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.