

# Udders tbs

Lietošanai dzīvniekiem  
(slaucamām govīm)



## Dabīgas vielas saturošs kopšanas līdzeklis govīm cietlaišanas laikā

Propolisu un augu ēteriskās eļļas saturošs kopšanas līdzeklis.

Lieto slaucamo govju cietlaišanai, ja govs tesmenis ir vesels (govs cietlaišanas brīdī neslimo ar klīnisku vai subklīnisku mastītu).

Produkts ir dabīga alternatīva cietlaišanas antibiotikām, samazina to lietošanu un mastītu risku nākošajā laktācijā. Produkts nesatur bismuta nitrātu.

Produkts imitē un paātrina fizioloģiski nepieciešamā keratīna korķa veidošanos pupa kanālā cietlaišanas laikā, noslēdzot pupa kanālu un neļaujot caur to iekļūt mikroorganismiem, kuri var izraisīt tesmens iekaisumu cietstāves un atnešanās laikā.

Sastāvā esošajām augu ēteriskajām eļļām piemīt antimikrobiāla iedarbība, savukārt propolisa ekstrakts stimulē imunitāti, veicina audu reģenerāciju, un tam piemīt pretiekaisuma iedarbība.

### SASTĀVS.

Tējas koka (*Melaleuca alternifolia*) lapu eļļa, timiāna (*Thymus vulgaris*) lapu eļļa, propolisa ekstrakts, linalols, limonēns, magnija stearāts, šķidrās parafīns, koloidālais silīcijs.

### DEVAS UN LIETOŠANA.

Viena injektora saturu ievadīt katrā tesmeņa cetursknī cietlaišanas laikā, tūlīt pēc pēdējās slaukšanas reizes.

Ļoti svarīgi ir ievērot zemākminētos norādījumus (piesardzību un aseptiku, lai pupas neievadītu mikroorganismus).

- Katrai govij izmantot atsevišķu, tīru vienreizējas lietošanas gumijas cimdu pāri.
- Rūpīgi notīrīt un nosusināt pupus.
- Visu pupu virsmu nodezinficēt ar vismaz 65% etilspirtu vai izopropilspirtu saturošu dezinfekcijas salvetīti.
- Katra pupa galu maigi norīvēt ar jaunu dezinfekcijas salvetīti, līdz uz pupa gala un salvetītes vairs nav redzami netīrumi.
- Ļaut dezinfekcijas līdzeklim iedarboties vismaz 30 sekundes.
- Uzmanīgi noņemt injektora uzgaļa vāciņu, nepieskaroties uzgalim.
- Cieši satvert pupa pamatni starp pirkstiem savienojuma vietā ar tesmeni. Pagrieziet pupu nelielā leņķī. Ievadīt injektora saturu caur pupa kanālu, pupa apakšējā daļā zemāk par vietu, kur pups ir satverts, izvairoties inficēt pupa galu.
- Pēc injektora satura ievadīšanas **nemasēt** pupus vai tesmeni.
- Pupos apstrādāt ar pēcslaukšanas dezinfekcijas līdzekli (iemērcot).
- Apstrādātās govīs atstāt aplokā vismaz 30 minūtes, lai pupu kanāli aizvērtos.

**IEROBEŽOJUMI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ.** Nav.

### ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā! Uzglabāt aizvērtā oriģinālā iepakojumā, vēsā tumšā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem un sasaldēšanas!

**IEPAKOJUMS.** 3,8 ml injektors.

**RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS un derīguma termiņš:** skat. uz iepakojuma.

**RAŽOTS** Polijā pēc Biowet Drwalew pasūtījuma.

**IZPLATA:** SIA „BERTAS NAMS”, Rīga, Ventspils iela 50, tel. 80000060